

15,50 cm

16,00 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

KNIFE
PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición: Difenconazole 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es nocivo por contacto.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fuese por la piel, lávela con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
SAMU: 106 / AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.: 961-925-844

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Titular del Registro, Importado y distribuido por:

NEXXT S.A.C.
Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156,
Piso 1 y 2, Edificio "El Pírate"
Urb. El Pírate (Piso 1 y 3),
San Luis, Lima-Perú
Tel.: 3261910



Registro PQUA N° 3340 - SENASA

Formulado por:
BAYUNO ESSENCE FINE CHEMICAL CO. LTD
P.O. Box 11, Chongqing 401321, China
Teléfono: 86 25 86455882 / 86455883

N° Lote:
F. de Form:
Contenido Neto: 5 L
F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO



**MODERAMENTE PELIGROSO
DANINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KNIFE es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es absorbido por las hojas, con una fuerte translocación transaminar acro-atax.

Para la preparación verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar esta al volumen de agua.

KNIFE se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación. "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre común	Plaga	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			Área Cultivos	Litro L/200L		
Espárrago	Royá	Shankyrium	0.2	7	0.05	
		Puccinia asparagi	0.5 - 0.65	21	0.03	
Ved	Oídio	Cercospora asparagi	0.35	7	0.05	
		Erysiphe asparagi	0.1 - 0.15	21	0.5	
Zapato	Levitilla blanca	Levitilla blanca	0.315	14	0.05	
		Alternaria porri	0.20	7	0.2	
Pimiento	Tijón veagano	Alternaria porri	0.20	7	0.8	
		Levitilla blanca	0.1 - 0.15	14	0.6	

PC: Período de Carenia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando las condiciones agroclimáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

COMPATIBILIDAD: KNIFE es compatible con la mayoría de los agroquímicos mas comunes.

FITOTOXICIDAD: KNIFE en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si quiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.