

140 mm

# KNIFE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN :**

Difenoconazole ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3340 – SENASA

**Titular de Registro:**  
NEXXT S.A.C.

Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156. Urb. El Pino (Piso 1 y 3). San Luis, Lima-Perú  
Teléfono: (01) 326-1910

**Formulador:**

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.  
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R. China  
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

**Importador y Distribuidor:**

NEXXT S.A.C.  
Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156. Urb. El Pino (Piso 1 y 3). San Luis, Lima-Perú  
Teléfono: (01) 326-1910

**N° de Lote:**

**F de Form:**

**F de Venc:**

Contenido neto : 20 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO

155 mm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN**
- Este producto es nocivo por contacto.
  - Causa daño temporal a los ojos.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Utilice ropa protectora durante el manejo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  - No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106  
AGRO UNITEK CROSPSCIENCE S.A.C.: 961-925-844

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

KNIFE es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es absorbido por las hojas, con una fuerte translocación translamina acropétala. Para la preparación verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

KNIFE se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación. Seguidamente se agita previa a la aplicación.

**Consulte con un ingeniero agrónomo**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200L		
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>		0.2	7	0.05
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5 - 0.65		21	0.03
	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.35		7	0.05
Vid	Oldiosis	<i>Erysiphe necator</i>		0.1 - 0.15	21	0.5
Páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.315		14	0.05
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>		0.20	7	0.2
Pimiento	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>		0.20	7	0.8
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>		0.1 - 0.15	14	0.6

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas

**COMPATIBILIDAD:**

KNIFE es compatible con la mayoría de los agroquímicos mas comunes.

**FITOTOXICIDAD:**

KNIFE en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si quiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

