

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: anilino pirimidinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. - En caso de ingestión realizar un lavado gástrico. Si la intoxicación es por inhalación y el paciente no respira, proporcionar respiración artificial. - No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

- Telefonos de emergencias: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROMQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para el ganado. - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - El producto no debe aplicarse en zona con napa freática superficial o suelo altamente permeable.

Tribut®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Pyrimethanil..... 400 g/L
 Aditivos..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 443-SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:

NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO., LTD.
 701-2 Golden Shore, N. 146 Huaishu Road, Ningbo 315020, China.
 Tel.: 0086-574-87641888. Fax: 0083-574-87641880

Importado y distribuido por:



Farmex

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
 San Isidro, Lima 27 - PERÚ
 Teléfono: (01) 630-6400
 www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIBUT® es un fungicida de contacto y con acción translaminar, que actúa como protectante y curativo de penetración.

TRIBUT® actúa como un inhibidor de la biosíntesis de la metionina, que a su vez inhibe la secreción de las enzimas producidas por los hongos y que son relevantes para iniciar la infección.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(mL/cil)	(L/ha)		
Alcachofa	Podrición gris	Botrytis cinerea	250	--	3	0.05
Fresa	Podrición gris	Botrytis cinerea	200	--	3	5
Mandarina	Podredumbre gris de la flor	Botrytis cinerea	200	--	21	10
Vid	Podrición gris	Botrytis cinerea	200	1 - 1.5*	21	4

PC: Período de carencia (días). LMR: Límite máximo de residuos (ppm).

* Volumen de aplicación 1000 - 1500 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para todos los cultivos se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña, considerando solo una campaña por año y con un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

TRIBUT® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

