

# METRILAQ® 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

## COMPOSICIÓN:

Methomyl ..... 900 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 3364 - SENASA

“Venta solo por prescripción de un ingeniero agrónomo”

## TITULAR DEL REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ S.A.C.

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores, Lima - Perú

Teléfono: +51 1 444 - 3663

## IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AGRIPAC PERÚ S.A.C.

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores, Lima - Perú

Teléfono: +51 1 444 - 3663

## FORMULADOR:

PT. Inti Everspring Indonesia

Jl. Raya Salira Indah, Desa Mangunreja, Serang,

Banten, Indonesia, 42455. Teléfono: +62 21 5790524



Contenido Neto: 25 kilogramos

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere o inhala. No ingiera ni respire el polvo o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en buenas condiciones en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el maipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Grupo químico: Carbamatos.
- En caso de intoxicación por inhalación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente, no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.
- Antídoto: Sulfato de atropina.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 - INFOSALUD: 113 - CICOTOX: 0800-1300  
AGRIPAC PERÚ SAC: (01) 444-3663

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o muy en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: METRILAQ® 90 SP

es un insecticida del grupo de los carbamatos, que actúa por contacto e ingestión, también posee actividad sistémica ascendente y actividad transaminar cuando se aplica a las

hojas. Actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en la sinapsis del insecto. Aplicar METRILAQ® 90 SP en mezcla con un volumen suficiente de agua uniformemente sobre el follaje de las plantas. Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad recomendada de METRILAQ® 90 SP y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar METRILAQ® 90 SP (i.e. Methomyl) una a dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando dos campañas al año en espárrago, y una campaña al año para palto y vid y cuando se observe un grado de infestación alto.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se debe esperar un tiempo de hasta 48 horas para ingresar al sector tratado.

**COMPATIBILIDAD:** Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

## Cuadro de usos:

| CULTIVOS  | PLAGA             |                       | DOSIS         |         | PC<br>DÍAS | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|---------|------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN      | NOMBRE CIENTÍFICO     | kg/ha         | kg/200l |            |              |
| Espárrago | Thrips            | Thrips tabaci         | 0,4           | -       | 2          | 2            |
|           | Gusano de tierra  | Copitarsia turbata    | -             | 0,2     | 1          | 2            |
|           | Gusano perforador | Heliolithis virescens | -             | 0,2     | 1          | 2            |
|           | Gusano cogollero  | Spodoptera frugiperda | 0,4           | -       | 1          | 2            |
| Palto     | Quersa            | Florinia florinae     | -             | 0,150   | 1          | 0,02         |
|           | Gusano de cesto   | Oiketikus kirbyi      | 0,5           | -       | -          | -            |
| Vid       | Thrips            | Thrips tabaci         | 0,175 - 0,200 | -       | 1          | 0,02         |

PC: Periodo de Carencia (días) / LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm) Partes por millón

