

26 x 15 cms



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Isoxazoline.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú: (01)4345600; CISPROQUIM: 080050847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

"Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".

"Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".
"Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos treinta (30) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuestos en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Tóxico para abejas. No aplicar en situaciones en las cuales las abejas puedan estar en contacto directo con el producto.



INCIPIO® 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada – (SC)

COMPOSICIÓN:

Isocycloseram: 200 g/l

Aditivos: c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 3368-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A.

Sucursal del Perú

Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb.

Los Granados

Santiago de Surco, Lima - Perú

Teléfono: 434-5600



Formulado por:

Syngenta Limited

(Grangemouth Manufacturing Centre)

Reino Unido

Importado y Distribuido por:

TOC TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle Reni Discartos No 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Telf: (01) 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 L



NO CIVO EN CASO DE INGESTION
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



Los nombres de producto que contengan @ o TM y el logo de SYNGENTA son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INCIPIO® 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo 30 IRAC (moduladores alostéricos de los canales cloro mediados por el GABA) actúa inhibiendo el receptor nervioso del glutamato en los insectos; tiene efecto de contacto e ingestión sobre estados inmaduros (larvas y ninfas) y adultos.

Para la preparación, verter la cantidad de **INCIPIO 200 SC** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.

INCIPIO® 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

Para mejorar la eficacia de **INCIPIO® 200 SC** en Prodiplosis se recomienda el uso de un adyuvante no iónico con propiedades dispersantes.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		l/ha	ml/cil		
Café	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	0.2	100 ²	21	0.04
	Mosca minadora (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)		125 ²		
Papa	Mosquillo de brotes (<i>Prodiplosis longifolia</i>)		150 ²	15	0.01
	Mosquilla de los brotes (<i>Prodiplosis longifolia</i>)	0.25	125		
Pimiento	Gusano del fruto (<i>Symmetrichemum capsicum</i>)				
	Acaro hialino (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)		30 ¹	28	0.4
	Acaro del tostado (<i>Phyllocoptura oleivora</i>)				
Mandarina	Araña roja (<i>Panonychus citri</i>)		20 ¹	28	0.4
	Mosquilla de los brotes (<i>Prodiplosis longifolia</i>)	0.25-0.3	125-150		
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo (<i>Tuta absoluta</i>)			0.25	125
Vid	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)		20-30 ¹	78	0.01

PC: Periodo de Carencia LMR: Limite Máximo de Residuos. ¹ Gasto de agua: 1000 l/ha ²Gasto de agua: 400 l/ha Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN. Para tomate, pimiento, papa, vid, mandarina y café aplicar **INCIPIO® 200 SC**, 1 vez por campaña/año, como máximo. Para mandarina, aplicar en desarrollo de brotes y frutos. Para café, aplicar en etapa de fructificación y en papa, aplicar en etapa de crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO. Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD. **INCIPIO® 200 SC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente utilizados, para mayor seguridad es recomendable realizar una prueba de compatibilidad mediante una pre-mezcla con pequeñas cantidades **FITOTOXICIDAD.** **INCIPIO® 200 SC** no es fitotóxico en los cultivos recomendados, siempre que se aplique las cantidades recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - Ligeramente Peligroso



PELIGRO



6 pts

7 pts

5,2 pts