

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.



Contenido neto : 500 ml
Nº de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

ORANGEX®

500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Bifenazate..... 500 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 3291 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
 Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú

Formulado por:
anasac
 Zhejiang Longyue East Anasac
 Crop Science Co., Ltd.
 Town South Donghua District,
 Longyue County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:

hortus
 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
 organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ORANGEX® 500 SC es un acaricida que actúa por contacto sobre diferentes estados de desarrollo de los ácaros (huevos, ninfas y adultos), posee un prolongado efecto residual de control. Actúa inhibiendo la post síntesis del receptor GABA en el sistema nervioso del insecto, interfiere con la producción de energía en las mitocondrias inhibiendo el transporte de electrones específicamente en el complejo III en el citocromo b sitio Qo.

ORANGEX® 500 SC se usa disuelto en agua, a la dosis recomendada. Se aplica con cualquier tipo de pulverizador accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar una buena cobertura.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	0.15	0.67	14	0.9
Palto	Araña roja	<i>Oligonychus punicae</i>	0.10	0.44	7	0.02
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.1-0.15	-	1	2.0

PC: Período de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas contenidas en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



ATENCIÓN

