

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. • Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. • Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

• En caso de ingestión: Beber una cantidad moderada de agua caliente para inducir al vomito si se ingiere por error. Conseguir tratamiento médico • En caso de contacto con la piel: quítese la ropa y calzado contaminado, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos. Obtener tratamiento médico. • En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos con agua corriente con los párpados abiertos. • En caso de inhalación: alejarse del lugar a un sitio con aire fresco, busque atención médica. • No tiene antídoto específico, se recomienda tratamiento sintomático. • TELEFONOS DE EMERGENCIA:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación. • No permitir animales en el área tratada.

SARUTA

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Carvacrol..... 10 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro N° XXX - SENASA-PBA-EV
TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

ARIS
INDUSTRIAL

FORMULADO POR: INNER MONGOLIA KINGBO BIOTECH CO., LTD.

East of Chemical Fertilizer Factory, Dengkou County
Bayannaer, Inner Mongolia, China. Telf.: +86-1891080153

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 500 mL

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SARUTA es un fungicida biológico que actúa por contacto, compuesto por carvacrol (extracto de orégano). **SARUTA** interactúa con la membrana celular, donde se disuelve en la bicapa de fosfolípidos. Esta distorsión de la estructura física provoca la expansión y desestabilización de la membrana, aumentando su fluidez, lo que a su vez aumentaría la permeabilidad pasiva, provocando daños y muerte del hongo. Preparación y aplicación: **SARUTA** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla vertiendo la dosis recomendada en la etiqueta en un balde con agua, agitando hasta formar una mezcla homogénea. Luego vaciar en el recipiente definitivo y completar el volumen de agua requerido para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid.	Oïdiosis	<i>Erysiphe necator</i>	1.0 - 1.25	N.A.	N.A.
Pimiento	Oïdium	<i>Leveillula taurica</i>	1.0	N.A.	N.A.
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	N.A.	N.A.

PC: Período de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno o al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda aplicar máximo 3 veces por campaña, con un intervalo de 7 días. Rotar luego con un plaguicida con modo de acción diferente.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar durante las primeras 12 horas después de finalizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SARUTA es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

SARUTA no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

