

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión: Beber una cantidad moderada de agua caliente para inducir al vomito si se ingiere por error. Consequir tratamiento médico
- En caso de contacto con la piel: quítese la ropa y calzado contaminado, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos. Obtener tratamiento médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos con agua corriente con los párpados abiertos.
- En caso de inhalación: alejarse del lugar a un sitio con aire fresco, busque atención médica.
- No tiene antidoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia: **ARIS INDUSTRIAL S.A.:** (01) 336-5428 | **SAMU:** 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.
- No permitir animales en el área tratada.



EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Carvacrol..... 10 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro N° 0210-SENASA-PBA-EV

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428



FORMULADO POR: INNER MONGOLIA KINGBO BIOTECH CO., LTD.

East of Chemical Fertilizer Factory, Dengkou County
Bayannaer, Inner Mongolia, China.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1L, 20 L y 200 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SARUTA es un fungicida biológico que actúa por contacto, compuesto por carvacrol (extracto de orégano). **SARUTA** interactúa con la membrana celular, donde se disuelve en la bicapa de fosfolípidos. Esta distorsión de la estructura física provoca la expansión y desestabilización de la membrana, aumentando su fluidez, lo que a su vez aumentaría la permeabilidad pasiva, provocando daños y muerte del hongo.

Preparación y aplicación: **SARUTA** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla vertiendo la dosis recomendada en la etiqueta en un balde con agua, agitando hasta formar una mezcla homogénea. Luego vaciar en el recipiente definitivo y completar el volumen de agua requerido para la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.75 - 1.0	N.A.	N.A.
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.8 - 1.0	N.A.	N.A.
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	N.A.	N.A.

PC: Período de Carenia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno o al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda aplicar máximo 3 veces por campaña, con un intervalo de 7 días. Rotar luego con un plaguicida con modo de acción diferente.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar durante las primeras 12 horas después de finalizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SARUTA es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

SARUTA no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

