

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



CACIQUE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Nicosulfuron.....	40 g/L
Atrazine.....	200 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3369 - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA Ltd

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road,

Jiangyin, Jiangsu, China.

Tel. (86-510)80618101

Contenido Neto: 20 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



ATENCIÓN

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- CUIDADO, evite el contacto, posible carcinogénico.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Triazina + sulfonilurea**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentra incoherente.
- En caso del contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Llamar a un médico.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CISPROQUIM 080-050-847**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CACIQUE® es un herbicida post emergente y de acción sistémica, absorbido rápidamente a través del follaje y raíces, recomendado para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz.

CACIQUE® está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado y prolongado control sobre las malezas. La Atrazina ejerce su acción a través de la inhibición de la fotosíntesis causando la destrucción de la clorofila y carotenoides; mientras que el Nicosulfuron inhibe la biosíntesis de aminoácidos de cadena ramificada, interrumpiendo la producción de proteínas y provocando la muerte en un amplio espectro de malezas. Las malezas dejan de crecer inmediatamente después de la aplicación y dentro de 4 a 5 días se observa el decoloramiento en las hojas jóvenes seguida de necrosis.

Agitar el producto antes de usar. Se recomienda llenar el cilindro con agua hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **CACIQUE®**; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña como mínimo, considerando 2 campañas al año. Aplique el producto cuando el cultivo de maíz presente 4 a 5 hojas verdaderas (30 cm de altura) y cuando las malezas presenten de 2 a 6 hojas verdaderas y se encuentren en activo crecimiento y el suelo se encuentre en capacidad de campo. Hacer rotaciones con grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CACIQUE® no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina ni con insecticidas órgano-fosforados. No se recomienda la mezcla con Bentazono, ni con 2,4-D. Para otros productos se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información manéjese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maíz	Amor seco Pega Pega Pata de gallina	<i>Bidens Pilosa</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Eleusine indica</i>	1	45	0.05* 0.01**

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

*Atrazine
**Nicosulfuron

