

Longitud Total 28.9 cm.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático.
- Teléfono de emergencia: SAMU 106
Tecnología Química y Comercio S.A. 01 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CHEETAH®

**EXTRACTO VEGETAL
INSECTICIDA-FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

COMPOSICIÓN:

Aceite de Neem 720 g/L
Aditivos csp 1L

REG.PBA-EV N° 148-SENASA



Titular del Registro, Formulador:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565



Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565
R.U.C. N° 20307150981

Fecha de Formulación:
Lote N°:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- CHEETAH es un Insecticida-fungicida de origen natural, de amplio espectro y elevada selectividad. Actúa por contacto y es preventivo contra las enfermedades. Además actúa, afectando la alimentación, reproducción y crecimiento de los insectos y ácaros.
- CHEETAH se aplica en aspersión, diluido en agua empleando equipos de aplicación terrestre manual, a motor o a tracción.
- Modo de preparación:** llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de CHEETAH, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, agitando la solución constantemente. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.
- Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Cil 200 L		
ARÁNDANO	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	1.0 - 1.3	N.A.	N.A.
FRESA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 2	N.A.	N.A.
PALTO	Mosca Blanca	<i>Aleurodicus julekiae</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.75 - 1.0	N.A.	N.A.
PIMIENTO	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	1.5	N.A.	N.A.

P.C: Periodo de carencia L.M.R. Límite máximo de residuos NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En aplicaciones preventivas de enfermedades o en infestaciones iniciales aplicar con una frecuencia de 5 a 10 días. En condiciones que favorezcan el desarrollo de la plaga o infestaciones altas, acortar la frecuencia a 5 días. Aplicar CHEETAH durante las primeras horas del día o al atardecer. Aplicar desde floración hasta el crecimiento de frutos, el número de aplicaciones máxima es de 3 para el cultivo de arándano, con un gasto máximo de agua de 1100 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO:

Después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones".



PRECAUCIÓN



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

Cyan Magenta Amarillo Negro Pantone 347 C

Altura Total 13.5 cm.