

19 cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

VITANICA RZ[®]

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Bacillus amyloliquefaciens cepa FZB42.....49 g/L

Aditivosc.s.p. 1 L

Contiene de 1.0 a 1.6 x 10⁹ UFC/mL

Reg. N° xxx-SENASA-PBA-ACBM

 **INTEROC**


Pasión por la innovación

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena Del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:

Compo Expert GmbH.
krogerweg 48155 Munster
+49 251 297981-000



Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido Neto: 12 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

22 cm

3:30 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
 Causa irritación ocular y dermal, evitar el contacto con la piel y ojos.
 Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas y bebidas, ni forrajes.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
 En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Llame al médico inmediatamente.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Consultar con el médico.
 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llevar al paciente al médico.
 Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
SAMU: 106
INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VITANICA RZ® es un fungicida y bactericida biológico de uso preventivo y curativo. **VITANICA RZ®** actúa de forma eficiente compitiendo por los macro y micro nutrientes en la superficie de la hoja. Además, tiene las siguientes propiedades: produce y libera lipopéptidos que combaten las bacterias, secreta metabolitos que impiden la unión, germinación, crecimiento y penetración de las esporas de los hongos en la planta y produce proteasas que pueden degradar las estructuras fúngicas.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende adicionar la cantidad de **VITANICA RZ®** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar y mezclar. Adicionar el resto de agua y asperjar el producto.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para el cultivo de la vid, aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, se recomienda aplicar un máximo de 1 aplicación por campaña, una campaña al año. Considerando un gasto de agua de 1000 a 1200 litros por hectarea.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas". Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/cil de 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	N.COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	1.0 - 1.5	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carenia
 N.A.: No aplica

LMR: Límite Máximo de Residuos

