

52 cm
53.4 cm
54.4 cm



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:
Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N°: 279-SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

A member of ADAMA
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000.

Formulado por:
Nantong Jinling Agrochemical Co. Ltd.
Second Huanghai Road, Yangkou Chemical Park
Rundong, Jiangsum Province
China

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 4 L

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo Químico: Triazol
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Luego de una hora de ocurrido el vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento es sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.
Teléfono de emergencia: SAMU: 106, AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000. CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido de los envases, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.





PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:
Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N°: 279-SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

A member of ADAMA
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000.

Formulado por:
Nantong Jinling Agrochemical Co. Ltd.
Second Huanghai Road, Yangkou Chemical Park
Rundong, Jiangsum Province
China

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 4 L

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
MIDAS® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "oidiosis" en los cultivos de vid, manzano y pimiento. **MIDAS®** se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”						
CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L		
VID	"Oidiosis"	<i>Uncinula necator</i>	0.30-0.75	60-100	14	6
MANZANO	"Oidiosis"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.30-0.75	80-100	21	1
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.40-0.50	200-250	7	1
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura" "Roya"	<i>Stemphylium vesicarium</i> <i>Puccinia asparagi</i>	----	150-200 100-150	21	0.05
ALCACHOFA	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	----	150-200	7	0.6

L.M.R.= Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 10 a 14 días y, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"
® Marca Registrada



1 cm