"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# **DÉTEMER**

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición: Butachlor Aditivos 

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular de Registro: NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C. Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru Teléfono: (01) 222-2795

Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTD.

Nindbo Generic Chemical Co., Elb. Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street, Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China. Teléfono: +86-574-87301088

Importador y Distribuidor: AGRONEGOCIOS PAMPA BONITA S.A.C. Jr. San Martin 534 (Primer Piso) – Bellavista – San Martin – Perú. Teléfono: +51-42-780-171

Nº de Lote:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** 

NO INFLAMABLE

Contenido neto : 10 L NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

# "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Realice la aplicación siguient) la dirección del viento.

  MINTRUCCIONED La PRIMEIRO SOLUXILLOS
   Grupo Químico. CHI. ORXIACETANILIDE
   Craso de influezado flame al médico, inmediatamente o lieve al pucario al midicio y muestro le a etiquata.

  De la companio del la comp
- necesario. ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (01) 222-2795

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

ACIOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres eveces este envese y vietra la sulcición en la mezcia de aplicación y luego institución britariando o perforâncido de la properación y luego institución britariando o perforâncido. Después de la contra de la competitación y luego institución de la competitación de la comp

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases
- vacios. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. relación de la tuterte de la guardo en estaco de la aplicación hacia cuerpos de agua de al menos do metos. Pelegioso para animalas domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir Peligioso para animalas domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir Peligioso para animalas domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales en suelos altamente permeables. En caso de derrame, el producto debe ser recopitado inmediatamente y depuested en un lagra seguro a fin de evitar su tiovisción hacia aguas depuested en un lagra seguro a fin de evitar su tiovisción hacia aguas despuestes de un lagra seguro a fin de evitar su tiovisción hacia aguas

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA						
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN  - Este producte de oculadado, no igno.  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcia y aglicación.  - Conservar el producto en el envase original, efiquetado y cerimo.  - Almacenar el producto baje techo, en un higar fesco, seco y bien ventidado.  - No almacenar in transportar conjuntamente con jamentos, medicinas, besidas, inforrage.  - No almacenar en intransportar conjuntamente con jamentos, medicinas, besidas, inforrage.	DÉTEMER proteina d principalm Llenar con dosis reco capacidad	CIONES DEUSO Y MANELO  "As eu n herbicido sistemico que inhibe la sintesis de las plantas, es un herbicida residual que se absorbe ente por los brotes germinales y a trevas de las raises, agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la mendada y remover, finalmente completar con agua la total del tanque, remover y aplicar.  onsulte con un ingeniero agrónomo				
<ul> <li>Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y banese con abundante aqua y jabon.</li> </ul>		Plaga				
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.	Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS		Coquito	Cyperus rotundus			
- Grupo Químico: CHLOROACETANILIDE - En caso de intexicación llame al médico, inmediatamente o lleve al	ARROZ	Verdolaga	Portulaca oleracea	4	90	0.01
paciente al médico y muestrele la etiqueta.  En caso de ingestión, no inducir al vomito, no administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.		Moco de pavo	Echinochloa cruz- galli			
En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 mínutos, mantener los parpados abiertos retirar los lentes de contactor el les bubiers.		Pata de Gallina	Eleusine indica			

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar DÉTEMER<sup>®</sup> (La. Butachlor) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año. Aplicar cuando las malezas están en activo crecimiento.

PERÍODO DE REINGRESO No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación

### COMPATIBILIDAD DÉTEMER® es compatible con la mayoría de productos

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos=

RESPONABILIDAD CIVIL.
El tibular de registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aqui recomendados, sis eus ay maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el tibular de registro con el distributor del producto.











