

# KRIS 75 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**


**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Tricyclazole.....750 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1398 - SENASA

**Fórmula empírica:** C<sub>9</sub>H<sub>7</sub>N<sub>3</sub>S  
**Peso Molecular:** 189.24 g/mol  
**Fórmula estructural:**  
**Tricyclazole**



**Propiedades Físicas y químicas del producto formulado**

Apariencia: Sólido  
Color: Rosa a naranja  
Olor: Sin olor característico  
Densidad: 0.34 - 0.39 g/mL  
pH: 6.0 - 8.0 a 20°C  
Persistencia a la espuma: máx. 50mL  
Corrosividad: no corrosivo.  
Estabilidad en el almacenamiento: Estable por 2 años a condiciones normales de almacenamiento.

**Envases: 250g, 1Kg, 4Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg**

**Titular de Registro:**

**UPL PERU S.A.C.**  
Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Oyague, Jesús María - Lima.  
Teléfono (01) 611 0831

**Formulador:**

**LAOTING YOLOO BIO - TECHNOLOGY CO., LTD.**  
No. A-3 Tianjin Road, Looting Economic Development  
Zone, Hebei Province, 063600, China.  
Teléfono: +86-0315-5225666

**Importador y Distribuidor:**

**DEMETRA GROUP SAC**  
Calle Gamma Mz. B-7 L-19 Urb. Bocanegra Callao,  
Lima - PERÚ  
Teléfono: (51) 5754454

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Triazolobenzothiazole.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque vómito.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Aplicar respiración artificial de ser necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
UPL PERU S.A.C.: (01) 611 0831  
CISPROQUIM: 0800-50847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **KRIS 75 WP** es un fungicida sistémico, que actúa a nivel de la biosíntesis del ergosterol, deteniendo por ello el crecimiento del hongo.
- **KRIS 75 WP**, se prepara diluyendo la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación. Agitar constantemente para aplicar al follaje, realizando una distribución homogénea del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		Dosis (Kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25	30	1

P.C.: Periodo de carencia  
L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando se advierta los primeros signos de la enfermedad.
- Como máximo aplicar 1 vez por campaña/año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- **Dosis máxima: 0.25 Kg/ha.**

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada hasta después de transcurridos 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**KRIS 75 WP** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

**KRIS 75 WP** no causa fitotoxicidad en el cultivo a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

