

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

GATTEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Flutianil 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2897 - SENASA

Titular de Registro:

UPL PERU S.A.C.

Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Oyague, Jesús María - Lima
Teléfono (01) 611-0831



Formulador:

OAT Agrio Co., Ltd.

1-3-1, Kanda Ogawa-machi, Chiyoda-Ku, Tokio 101-0052, Japón

Importador y Distribuidor:

DEMETRA GROUP SAC

Calle Gamma Mz. B-7 L-19 Urb. Bocanegra Callao, Lima - PERÚ
Teléfono: (01) 5754454



Fecha de formulación:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO: 5 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspiración)
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Thiazolidine
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 /UPL PERU SAC: (01) 611-0831 / CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GATTEN es un fungicida para el control de oidiosis en el cultivo de vid. **GATTEN** es fungicida con actividad protectora, curativa, residual y movilidad translaminar, que inhibe la esporulación para el control de oidio en vides, como se indica en el cuadro de Instrucciones de uso. **GATTEN** puede usarse en programas que sean compatibles con los principios del Manejo Integrado de Plagas (MIP), que incluyen el uso de variedades de cultivos resistentes a enfermedades, prácticas culturales, detección de plagas y sistemas de pronóstico de enfermedades que reducen las aplicaciones innecesarias de pesticidas.

Flutianil, el ingrediente activo de **GATTEN**, es una nueva clase química de fungicida del grupo de tiazolidina y pertenece al grupo de acción FR13 U13.

GATTEN es efectivo para uso estratégico en programas que intentan minimizar la resistencia a los fungicidas. Realizar las aplicaciones de **GATTEN** vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/cil 200L		
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.5	0.084 - 0.096	14	0.7
ARÁNDANO	Oidiosis	<i>Microsphaera penicillata</i>	0.300 - 0.375	0.100 - 0.125	7	0.5

P.C. Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Para el cultivo de vid, se recomienda realizar hasta dos aplicaciones por campaña como máximo (una campaña/año). El intervalo entre las aplicaciones no debe ser menor de 7 días, dependiendo de la presión de la enfermedad. El momento de aplicación es desde el desarrollo vegetativo a fructificación (desde cuajado de frutos).
- Para el cultivo de arándano, se recomienda realizar 1 aplicación por campaña (una campaña/año) cuando se manifieste los primeros síntomas

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar hasta 24 horas después de la aplicación, sin el equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

No se conoce incompatibilidad con otros productos. Antes de mezclar con otros plaguicidas se debe realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos, siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.