

12 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PROTECTHOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**
**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**
**Composición:**

Azoxystrobin ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**PQUA N° XXX - SENASA**
**Titular del registro: Innovaciones y Formulaciones SAC**
**Importador y Distribuidor:**

INNOVACIONES Y FORMULACIONES S.A.C  
Av. Trapiche N° Ref (Mz. G, Lote N° 16),  
Comas, Lima-Perú.


**Formulador:**

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.  
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R. China  
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

**F. de form:**
**N° Lote**
**Contenido Neto: 100 g**
**F. de venc:**
**NO INFLAMABLE**
**NO CORROSIVO**
**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

12 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere. Evite todo contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Estrobilurinas.
- Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**SAMU: 106**
**INNOVACIONES Y FORMULACIONES S.A.C.: (51)  
1 562-9116**
**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

PROTECTHOR es un fungicida del grupo de las estrobilurinas de amplio espectro sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas. Es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de oidium. Actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento micelial con un prolongado efecto residual. Para la preparación llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad de PROTECTHOR recomendada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

No hacer aplicaciones con alta temperatura ambiental. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones favorezcan la deriva. No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación al follaje.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar PROTECTHOR (i.a. Azoxystrobin) de 02 a 03 aplicaciones por campaña como máximo en pimiento (2 campañas/año); y 2 aplicaciones por campaña como máximo en espárrago (2 campañas/año), en vid, mandarina y palto (1 campaña/año). Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

PROTECTHOR es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentraciones empleadas.

**FITOTOXICIDAD:**

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo   | Plaga            |                        | Dosis   |          | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|------------------|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|           | Nombre común     | Nombre científico      | kg/200L | kg/Ha    |           |           |
| Pimiento  | Oidium           | Leveillula taurica     | 0,1     | -        | 3         | 3         |
| Espárrago | Mancha del peral | Stemphylium vesicarium | -       | 0,15     | 100       | 0,05      |
| Vid       | Oidiosis         | Erysiphe necator       | 0,075   | -        | 14        | 2         |
| Mandarina | Podredumbre gris | Botrytis cinerea       | -       | 0,2-0,24 | 0         | 15        |
| Palto     | Podredumbre gris | Botrytis cinerea       | -       | 0,15-0,2 | 35        | 0,05      |

**PC: Periodo de Carencia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)**
