

20.00 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, accidental del producto, no provoque el vómito a menos que así lo indique un profesional de salud.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
- No existe antídoto específico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / NUTRITEC COMPANI SAC: 324 6534

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PACTRAZOL
250 SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos.....csp 1L

Reg. RCP N° 0116-SENASA

Titular del registro: Nutritec Compani SAC

Importado y distribuido por:
Nutritec Compani SAC

nutritec
Compani SAC

Cal. Felipe S. Crespo N° 421
San Luis, Lima-Perú
Tel.: 324 6534 Cel.: 983 481 769
www.nutritec.biz

Formulado por:

Sinochem Ningbo LTD.
21 JiangXia St., Ningbo China. Zip Code: 315000. China

N° de Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

Contenido Neto:

10 L

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PACTRAZOL 250 SC es un regulador de crecimiento de acción sistémica y basipetala, que se aplica en el cultivo de palto en los momentos de floración del cultivo y luego para limitar el crecimiento vegetativo de primavera y verano.

PACTRAZOL 250 SC se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

Para la preparación de la mezcla, se vierte la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar esta al volumen de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Dosis L/ha	Frecuencia y Epoca de Aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
Palto	4 - 5	Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña por año durante la etapa de floración y crecimiento vegetativo de primavera / verano	120	0.5

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña por año durante la etapa de floración y crecimiento vegetativo de primavera / verano.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado

COMPATIBILIDAD: **PACTRAZOL 250SC** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



14.00 cm