

27.60 cm

14.50 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. Si la irritación persiste, llamar al médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre, mantenerlo caliente y en reposo. Si la respiración es irregular o se detiene practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca si esta inconsciente, ponerlo en posición adecuada y buscar ayuda médica.

Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106

CICOTOX: (01) 328-7700

Grupo Agrotecnología del Peru SAC: +51 960 717 869

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos, con los desechos de envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



SANTEM 4%

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Extracto de *Chrysanthemum cinerariaefolium* 39.0 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro N° xxxx- SENASA-PBA-EV

Titular de Registro:

GRUPO AGROTECNOLOGÍA DEL PERÚ S.A.C.
Av. Ricardo Palma Nro. 341 Int. 304, Miraflores, Lima, Lima.

Formulado por:

IDAI NATURE S.L.
Dirección: Calle Moscú,10 – Pol. Ind. Mas de Tous
46185 La Pobl de Vallbona, Valencia, España
Tel.: +34 961661414

Importado y distribuido por:

Hortus S.A.
Calle Sucre 270, Ate, Perú
Tel.: (01)748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto: 5 L
N° Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SANTEM-4% es un insecticida de aplicación foliar. Actúa sobre la bomba de sodio de las neuronas. Mediante un proceso fisicoquímico estas moléculas inhiben el cierre del canal de sodio de la membrana celular, de manera que producen una transmisión continua son los temblores, la parálisis muscular y eventualmente, la muerte.

Mantener la mezcla en agitación constante hasta formar una suspensión homogénea y aplicar por vía foliar. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar. Realice las aplicaciones a favor del viento.

No almacenar en zonas de temperaturas demasiado elevada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	(días)	(ppm)
Vid	Chanchito blanco	Pseudococcus viburni	0.2 - 0.3	N.A.	N.A.

PC: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Al inicio del ataque de la plaga. El número de aplicaciones depende de la gravedad del problema. Se aconseja realizar de 2 a 4 aplicaciones por campaña a intervalos de 10 a 15 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

No deja residuos por lo que no tiene período de reingreso.

COMPATIBILIDAD

Buenas sinergias con otros insecticidas. Realizar pruebas de compatibilidad si se mezcla con otros productos. Productos con pH alcalinos pueden desestabilizar la molécula de piretrina, si se usan, regular previamente el pH de la disolución.

FITOTOXICIDAD

SANTEM-4% no presenta fitotoxicidad en los cultivos ensayados utilizando las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

