
"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO'** 

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial: SUPRATHOR® Nombre común: SPIROTETRAMAT Clase: INSECTICIDA AGRÍCOLA Reg. PQUA N° 3311 - SENASA

Composición: Spirotetramat. 240 g/L Aditivos . . c.s.p. 1L

Fórmula empírica: C<sub>21</sub>H<sub>27</sub>NO<sub>5</sub> Peso molecular: 373.45 g/mol Fórmula estructural:



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL NOCIVO SI SE INHALA

TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- · Apariencia: Líquido. · Color: Blanco.
- Olor: Inodoro.

años.

consumo

·Estabilidad en el almacenamiento: **SUPRATHOR®** conserva sus características fisicoquímicas a condiciones normales de temperatura y almacenamiento por lo menos 2

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco v ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies.
- -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las
- primeras 12 horas después de la aplicación. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS** - Grupo químico: Tetramic acid.

- -En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- -En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. -En caso de contacto con los ojos, lavarlos con
- abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- -Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 1 SICSAC: (01) 644-9297

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturandolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio
- autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- -Tóxico para abejas. No aplicar en época de floración. Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los
- desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la
- aplicación o sobrantes del producto Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de
- agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en
- el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**ATENCIÓN** 









## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ŞUPRATHOR**<sup>®</sup> es un insecticida foliar del grupo de los Acidos tetrámicos (Ketoenoles), inhibidor de la biosíntesis de los lípidos de tal manera que la muda no puede completarse, ocasionando la muerte del insecto. Una vez que penetra en la planta, Spirotetramat se hidroliza a su forma enólica siendo móvil dentro del floema de la planta, por tanto, se puede mover acropetala y basipetalamente. Debido a su ambimovilidad, el nuevo follaje desarrollado después de la aplicación por aspersión también es protegido.

El modo de acción del SUPRATHOR® es mediante inhibición de la lipogénesis en insectos tratados, lo que resulta en una disminución del contenido de lípidos, inhibición del crecimiento de los insectos más jóvenes y reducción de la capacidad de reproducción de los insectos adultos.

Aplicar con equipos terrestres de aspersión, previamezcla con agua. Para realizar la aplicación haga una mezcla del producto a la dosis recomendada con la mitad del volumen de agua a utilizar, luego agite hasta que el producto esté bien diluido y complete el volumen de aplicación. Asegurarse que el equipo de uso y correctamente calibrado para evitar sobre o sub dosificaciones del producto.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVO	PLAGA			DOSIS			P.C.	L.M.R.
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L	./ha	L	200L	(días)	(ppm)
	PALTO	Queresa	Fiorinia fioriniae	6		0.0	75-0.1	3	0.6
	VID	Trips	Thrips tabaci	0	.525		-	7	2

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo Residuos

## FRECUENCIAY ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se aplica generalmente cuando después de una previa evaluación se observa el comienzo del ataque de los insectos que afectan el cultivo ocasionando algún nivel de daño económico. Se recomienda 1 aplicación por campaña considerando para uva y palto 1 campaña por

## PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 12 horas de realizada la aplicación.

# COMPATIBILIDAD

**SUPRATHOR**® es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

> CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)



#### Titular del Registro:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto.7A Z.I. El Agustino. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

#### Formulado por:

QINGDAO AGRO-UNITEK CROPSCIENCE CO. LTD. Room 304, Haierd Road N°63, Qingdao City, Shangdong China

Importado v Distribuido por: SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.







**ATENCIÓN** 

