

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite el contacto con el producto y la formación de vapores/aerosoles.
- Conserve el producto en un lugar sombreado, fresco y seco, bajo llave en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer o beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Si la respiración es deficiente brinde respiración artificial. Procure atención médica si fuese dificultosa.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consiga atención médica.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste acuda a atención médica.
- No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



NEMEND

EXTRACTO VEGETAL

NEMATICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN (SE)

Composición:

Extracto de tagetes erecta 77.55 g/L.
Aditivos c.s.p. 1 L.

Registro N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular del Registro:

GRUPO AGROTECNOLOGÍA PERU S.A.C.
Dirección: Av. RICARDO PALMA NRO. 341 INT. 304
Miraflores, Lima, Lima

Formulado por:

IDAI NATURE S.L.
Dirección: Calle Moscú, 10 – Pol. Ind. Mas de Tous
46185 La Poblá de Vallbona, Valencia, España
Tel.: +34 961661414

Importado y distribuido por:

Hortus S.A.
Calle Sucre 270, Ate, Perú
Tel.: (01)748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto: 1000 Litros

N° Lote:
F. de Producción:
F. de vencimiento

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NEMEND es un nematocida botánico capaz de controlar diversas especies de nemátodos fitoparásitos como: *Meloidogyne incognita* en diferentes cultivos.

Por tratarse de un producto biodegradable y de baja persistencia debe ser aplicado con condiciones climáticas favorables evitando horas de máxima insolación. Evitar aplicar cuando se pronostican lluvias abundantes 4 horas posteriores a la aplicación.

Aunque puede aplicarse en cualquier momento de desarrollo de la planta, es preferible emplearlo antes de la aparición de síntomas o signos de la enfermedad o en su defecto cuando estos comiencen su aparición. Las mayores poblaciones de nemátodos corresponden con los picos de formación de raíces, por eso es aconsejable aplicar el producto al inicio del cultivo entre los 15 a 20 días después del trasplante.

Puede aplicarse al sistema de riego o en Drench (de preferencia al cuello de la planta) dependiendo del tipo de cultivo al que se vaya a aplicar. Se recomienda aplicar en solución a un pH en torno a 5.5 para alcanzar su mejor potencial.

- Para aplicaciones en Drench: medir la cantidad recomendada del producto con agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme. Luego echar en el cilindro de aplicación. Proceder a aplicar con bomba de mochila, sin boquilla, luego a chorro dirigir la aplicación. Usar como mínimo 400 litros de volumen de agua por hectárea.

- Para aplicaciones al sistema de riego: inyectar la cantidad adecuada del nematocida junto con el agua de riego. Se recomienda aplicar el producto en la segunda mitad del riego. Ya sea con Venturi o con bomba de mochila. En este último caso se hace una premezcla en un balde de 10 litros con agua. Luego se echa a la bomba y se inyecta al sistema.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS (L./Ha.)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	“Nematodo del nudo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	4.5	N.A.	N.A.
Cebolla	“Nematodo del nudo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	4.5	N.A.	N.A.
Vid	“Nematodo del nudo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	4.5	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia; LMR: Límite máximo de residuos; N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Al inicio del ataque de la plaga. El número de aplicaciones depende de la gravedad del problema. Se aconseja realizar de 3 a 7 aplicaciones por campaña a intervalos de 5 a 7 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO

No deja residuos por lo que no tiene periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD

No se espera ni se conoce incompatibilidad química con otro tipo de insumos de uso agrario.

FITOTOXICIDAD

NEMEND no presenta fitotoxicidad en los cultivos ensayados utilizando las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Realizar pruebas previas de compatibilidad si se mezcla con otros productos.



PRECAUCIÓN



Ancho: 28 cm
Alto: 15 cm