

14,8 ± 0,1

14,8 ± 0,1

14,8 ± 0,1

19,9 ± 0,1

**FUZZIL**<sup>®</sup>  
800 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**  
Dinotefuran : 400 g/kg  
Fipronil : 400 g/kg  
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1732 - SENASA

**Silvestre**

**Titular del Registro:**  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores,  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

**Contenido Neto: 1 kg** (10 bolsas de 100 g)  
N° de Lote:  
F. de Form:  
F. de Venc:

**Formulado por:**  
NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.  
8 South Liyuan Road, Jiangning  
District, Nanjing, China.

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Neonicotinoides + Fenilpirazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta y la Hoja Informativa Adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto: específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**SAMU: 106**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300**



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**FUZZIL**<sup>®</sup>  
800 WG

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FUZZIL<sup>®</sup> 800 WG es un insecticida que combina la acción de dos ingredientes activos: Dinotefuran, actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina en las células nerviosas de los insectos, provocando parálisis y finalmente la muerte; y Fipronil, actúa bloqueando los canales de cloro regulados por el ácido gamma - aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hiperexcitación y convulsiones.

FUZZIL<sup>®</sup> 800 WG es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

FUZZIL<sup>®</sup> 800 WG puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Sogatodes oryzae</i>	100 - 200	51	0,8 (a) 0,005 (b)
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	80 - 100	14	0,1 (a) 0,005 (b)
ESPÁRRAGO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	100 - 200	21	0,01 (a) 0,005 (b)
PAPA	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes solani</i>	100 - 200	30	0,01 (a) 0,01 (b)
PIMIENTO	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	100 - 200	21	0,07 (a) 0,005 (b)
TOMATE	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	100 - 200	3	0,07 (a) 0,005 (b)
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	100 - 200	28	0,9 (a) 0,005 (b)

P.C.: Período de Carenancia (a) Dinotefuran (b) Fipronil L.M.R.: Límite Máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de FUZZIL<sup>®</sup> 800 WG. Aplicar en las primeras horas de la mañana o en la noche, para que no tenga pérdidas por deriva u otro factor medioambiental que afecte su eficacia. Para el cultivo de pimiento y papa, se recomienda realizar una (01) aplicación por campaña, en dos (02) campañas al año, en la etapa de desarrollo vegetativo.

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:** FUZZIL<sup>®</sup> 800 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes y materiales alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

