

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# LUTIOM SUPER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**COMPOSICION :**

Emamectin benzoate.....	100 g/kg
Lufenuron.....	400 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N°.....-SENASA**

**Titular del Registro: PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**

Av. Tomas Ramsey 930, Oficina N° 1210, Magdalena del Mar, Lima, Perú  
Teléfono: +51-1-222-2795

**Formulador: NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 10-6, Shidai Square, No. 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China  
Telf.: +86-574-87301088

**Importador y Distribuidor: NGC AGROSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**

Calle Enrique Palacios 360, Oficina N° 505, Miraflores, Lima, Perú  
Teléfono: +51-1-222-2795

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**



**Contenido Neto: 10 kg**

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TOXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS**



**PELIGRO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Avermectina, Benzoilurea.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico, muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene un antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: +51-1-222-2795**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en presencia del viento, a fin de reducir la deriva.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MODO Y MECANISMO DE ACCION**

LUTIOM SUPER es un insecticida formado por dos ingredientes activos, Lufenuron es un inhibidor de la síntesis de quitina que inhibe la muda, produciendo la muerte de larvas y pupas, mientras que Emamectin benzoate bloquea la transmisión neuroquímica que conduce a la contracción del músculo del insecto con parálisis y muerte.

**MODO DE EMPLEO**

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llène de agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del equipo pulverizador. Agregue la cantidad del producto de acuerdo con la dosis recomendada. Agitar la mezcla para homogeneizar y luego complete el tanque hasta el nivel deseado, usando siempre agua limpia.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.055-0.075	47	0.01 <sup>1,2</sup>
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.06	3	0.01 <sup>1,2</sup>
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.08-0.09	1	0.02 <sup>1</sup> 0.8 <sup>2</sup>

**PC:** Período de carencia (días)

**LMR:** Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)

<sup>1</sup>Emamectin benzoate, <sup>2</sup>Lufenuron

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar LUTIOM SUPER 1 vez por campaña, considerando 1 campaña al año.

**PERÍODO DE REENTRADA**

No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Evite mezclar con ácidos fuertes, bases fuertes, sustancias o agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**

