

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurin + Triazole
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 AGROCHEM EIRL: 949-703901

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.



MIGTY

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p

Reg PQUA N° 2668 - SENASA

Titular del Registro:

AGROCHEM EIRL
RUC: 20513143363
Calle Fuente del Maestro N° 166
Urb. Mayorazgo Chico Ate - LIMA
Teléfono: 949-703901 / 919-473763

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO. LTD
No.26 Majia street,
Nanjing 210009 China
Teléfono: +86 25 52621629
Fax: +86 25 63303203

Fecha de Form.:

N.º de Lote: N°:

Contenido Neto: 250 ml

Fecha de Venc.:

Importado y distribuido por:

AgroChem

AGROCHEM EIRL
RUC N°: 20513143363
Calle Fuente del Maestro N° 166,
Urb. Mayorazgo Chico-Ate
Teléf.: 949 703 901 / 919 473 763

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MIGTY es un fungicida sistémico y de contacto actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que con lleva finalmente la muerte del hongo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
UVA	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	14	2 ¹ / ₃ ²

L.M.R.: Límites máximos de residuos P.C.: Periodo de carencia

- 1 Azoxystrobin
- 2 Difenoconazol

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo. Cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 1 campaña al año. De ser necesaria una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 14 a 20 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

