

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MAICERO[®]

750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICION:

Nicosulfuron.....750 g/kg
 Aditivos.....c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° SENASA

Titular del Registro: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643



Formulador: FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.

N° 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical
 Industrial Park, Nanjing, China

Importador y Distribuidor: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 25 kg

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INHALA**



ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sulfonylurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO ANDINA S.A.C.: 989-004643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y despositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAICERO 750 WG es un herbicida selectivo en maíz. Controla gramíneas anuales y perennes, además de malezas de hoja ancha cuando es aplicado como post-emergente. Debido a que actúa principalmente por absorción foliar, no debe ser aplicado después que las malezas hayan emergido. No aplicar en plantas de maíz que tengan más de 50 cm de altura. Las malezas deben tratarse antes que compitan demasiado con el cultivo, por lo que se hace necesario aplicarlo tempranamente.

MAICERO 750 WG se prepara llenado el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad con agua; luego adicionar el producto. Complete con agua el volumen. Agite hasta que la mezcla sea homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	"Cadillo" "Chamico" "Grama" "Grama dulce" "Pata de gallina" "Pega pega"	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Leptochloa uninervia</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.05	60	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm-partes por millón)
PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

MAICERO 750 WG se aplica en post-emergencia, cuando el cultivo está en estadio de 2 a 6 hojas, después de la emergencia de las malezas. La aplicación debe dirigirse entre las filas cuando sea posible. Realizar como máximo 02 aplicaciones por campaña/año para el cultivo de maíz.

PERIODO DE REENTRADA

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MAICERO 750 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes fuertes o bases fuertes. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



ETIQUETA PARA USO EXPOSICIÓN

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MAICERO®

750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICION:

Nicosulfuron.....750 g/kg
 Aditivos.....c.s.p 1kg

Reg. PQUA N°SENASA

Titular del Registro: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Formulador: FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.

N° 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical
 Industrial Park, Nanjing, China

Importador y Distribuidor: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Fecha de Formulación:

Contenido Neto: 100 g

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO ANDINA S.A.C.: 989-004643

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	“Cadillo” “Chamico” “Gramma” “Gramma dulce” “Pata de gallina” “Pega pega”	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Leptochloa uninervis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.05	60	0.01

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm)

PC: Periodo de carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MAICERO[®]

750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICION:

Nicosulfuron.....750 g/kg
 Aditivos.....c.s.p 1kg

Reg. PQUA N°SENASA

Titular del Registro: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Formulador: FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.

N° 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical
 Industrial Park, Nanjing, China

Importador y Distribuidor: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Fecha de Formulación:

Contenido Neto: 90 g

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación."

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO ANDINA S.A.C.: 989-004643

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	"Cadillo" "Chamico" "Gramma" "Gramma dulce" "Pata de gallina" "Pega pega"	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Leptochloa uninervis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.05	60	0.01

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm)

PC: Periodo de carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MAICERO®

750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICION:

Nicosulfuron.....750 g/kg
 Aditivos.....c.s.p 1kg

Reg. PQUA N°SENASA

Titular del Registro: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Formulador: FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.

N° 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical
 Industrial Park, Nanjing, China

Importador y Distribuidor: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Fecha de Formulación:

Contenido Neto: 80 g

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación."

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO ANDINA S.A.C.: 989-004643

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	"Cadillo" "Chamico" "Grama" "Grama dulce" "Pata de gallina" "Pega pega"	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Leptochloa uninervis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.05	60	0.01

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm)
 PC: Periodo de carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MAICERO®

750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICION:

Nicosulfuron.....750 g/kg
 Aditivos.....c.s.p 1kg

Reg. PQUA N°SENASA

Titular del Registro: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Formulador: FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.

N° 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical
 Industrial Park, Nanjing, China

Importador y Distribuidor: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú.
 Teléfono: 989-004643

Fecha de Formulación:

Contenido Neto: 70 g

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación."

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO ANDINA S.A.C.: 989-004643

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	"Cadillo" "Chamico" "Gramma" "Gramma dulce" "Pata de gallina" "Pega pega"	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Leptochloa uninervis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.05	60	0.01

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm)

PC: Periodo de carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAICERO 750 WG es un herbicida selectivo en maíz. Controla gramíneas anuales y perennes, además de malezas de hoja ancha cuando es aplicado como post-emergente. Debido a que actúa principalmente por absorción foliar, no debe ser aplicado después que las malezas hayan emergido. No aplicar en plantas de maíz que tengan más de 50 cm de altura. Las malezas deben tratarse antes que compitan demasiado con el cultivo, por lo que se hace necesario aplicarlo tempranamente.

MAICERO 750 WG se prepara llenado el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad con agua; luego adicionar el producto. Complete con agua el volumen. Agite hasta que la mezcla sea homogénea

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	"Cadillo" "Chamico" "Grama" "Pata de gallina" "Pega pega"	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Leptochloa uninervis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.05	60	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm-partes por millón)
PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

MAICERO 750 WG se aplica en post-emergencia, cuando el cultivo está en estadio de 2 a 6 hojas, después de la emergencia de las malezas. La aplicación debe dirigirse entre las filas cuando sea posible. Realizar como máximo 02 aplicaciones por campaña/año para el cultivo de maíz.

PERIODO DE REENTRADA

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MAICERO 750 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes fuertes o bases fuertes. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

MAICERO[®]
750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Nicosulfuron.....750 g/kg
Aditivos.....c.s.p.1kg

Reg. PQUA N° ... -SENASA

Titular del Registro: **AGREVO ANDINA S.A.C.**
Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: 989-004643



Formulador: **FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.**
N° 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical
Industrial Park, Nanjing, China

Importador y Distribuidor: **AGREVO ANDINA S.A.C.**
Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: 989-004643

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**



ATENCIÓN




"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial: **MAICERO 750 WG**
Nombre común: **Nicosulfuron**
Clase: **Herbicida Agrícola**
Reg PQUA N° - **SENASA**

COMPOSICIÓN:
Nicosulfuron.....750 g/kg
Aditivos.....c.s.p.1 kg

Fórmula empírica: $C_{15}H_{18}N_6O_6S$
Peso molecular: 410.41 g/mol

Fórmula estructural:



Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Sólido
Color: Blanquecino
Olor: Muy ligero, agrio
Densidad: 0.45 - 0.65 g/ml (20°C)
pH: 5.0 - 8.0
Corrosividad: No corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: Conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas por lo menos dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA:

Capacidad	Material
70, 80, 90, 100 g	Bolsas trilaminadas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sulfonilurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO ANDINA S.A.C.: 989-004643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

