LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION
Consérvese el producto en envases originales, heméticamente cerrados. El producto debe ser transportado protegido con un embalaje y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la aplicación y manipuleo hacer uso de guantes, (de nitrilo de 13", 0.15 mm de espesor, modelo solvex), máscara protectora y lentes.
Despues de la aplicación en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación se recomienda lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel, quítese la ropa y lávese la piel contaminada con jabón y agua, buscar ayuda médica si la irritación persiste.
Contacto con los ojos : Enjuaguese con abundante agua por 15 minutos.
En caso de ingestión , no induzca al vómito, busque atención médica.
En caso de inhalación, remueva al paciente a un lugar con aire fresco.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847
BASF Peruana S.A.: 513 2505

NOTA AL MEDICO
No existe antídoto específico, tratamiento sintomático

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Evite la contaminación de fuentes de agua, no verter producto en ellas.

Cadre®70 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULADO DISPERSABLE (WG)

COMPOSICION:
Imazapic …….. …….. 70 %
Inertes …….. c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 054-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S. A.
Av. O. R. Benavides 5915 - Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf. : (01) 513 2500
Fax : (01) 513 2519

BASF
We create chemistry

FORMULADO POR:
BASF S.A.
Av. Brasil, 791
Bairro Eng. Neiva
Guaratinguetá SP - Brasil

CONTENIDO NETO: 350 g
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**
® = Marca Registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Cadre 70 WG es un herbicida del grupo de las Imidazolinonas que se recomienda en aplicación de pre – emergencia (al cultivo y maleza) para el control de *Rottboellia exaltata, Cynodon dactilon, Mimosa pigra, Paspalum paludivagum* y *Cyperus sp.* en el cultivo de caña de azucar, tanto en caña – planta como en caña – soca.

Sistemas de Preparación y Aplicación
Cadre 70 WG se puede aplicar con equipo manual. Es indispensable calibrar el volumen de agua y la cantidad correcta del producto para obtener un efectivo control.

Llenar el equipo con la mitad de agua requerida, agitar mientras se agrega el producto, mezclar bien y luego agregar la otra mitad del agua.

Se llena con agua (volúmen/ha de acuerdo al equipo a usar) hasta un tercio del depósito empleado para tal fin, se agrega la cantidad correspondiente de Cadre 70 WG completando luego la capacidad del recipiente. Después de una ligera agitación se tiene una mezcla estable, lista para ser aplicada.

CULTIVO	Malezas N.Técnico/N.Común	Dosis kg / ha	P.C.* (Días)	L.M.R.** (p.p.m.)
Caña de Azucar	***Rottboelia exaltata*** "Caminadora" ***Cynodon dactilon*** "Grama dulce" ***Mimosa pigra*** "Sensitiva" ***Paspaluim paludivagum*** "Grama gateada" ***Cyperus sp.*** "Coquito"	0,20 – 0,25	-	-

Dosis en función a un volumen de agua de 400 L – 600 L / ha

*P.C.: período de carencia ** L.M.R: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en pre-emergencia (al cultivo y maleza), tanto en caña planta como en caña soca. Aplicar cuando el suelo este húmedo o después de un riego. En caña soca no aplicar cuando la caña tenga más de 4 hojas.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al área tratada antes de 12 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es tóxico para los cultivos recomendados, se recomienda realizar pruebas previas en variedades nuevas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

015