13 cm

19 cm

GRAYROT

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Iprodione ..... 500 g/Kg

Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA Nº XXX - SENASA

Titular del Registro: AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.

Importado y distribuido por: AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.
Dirección: Jr. Pachacutec N° 339 (Alt. de Jr. Saenz Peña)
Amazonas, Utcubamba, Bagua Grande
Teléfono: 961-925-844
Email: agrounitek@gmail.com

联合利农 Agro-unitek

Formulado por:
JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15 Hubu Street Nanjing, 210002, China.
Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

F. de form:
N° de Lote:
Contenido Neto: **500 g**
F. de venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

13 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo químico:** Dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.

Nota al medico:
- **Antidoto:** Este producto no tiene antídoto especifico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 /
AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.: 961925844

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
GRAYROT es un fungicida miembro del grupo de las dicarboximidas, con acción de contacto y/o localmente sistémico, preventivo y curativo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas.
Se debe considerar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de aplicación de 15 días como mínimo, dependiendo del nivel de infección del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada antes de las primeras 12 horas.

COMPATIBILIDAD
GRAYROT es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes con excepción de los productos ácidos y fuertemente alcalinos. En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/ha		
Cebolla	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	1,00	14	0,2
Pimiento			-	1,00	3	7,0
Mandarina			-	1,500	30	0,01
Palto			-	1,00	30	0,01
Vid			0,300	-	7	20

PC: Periodo de Carencia (días) / **LMR:** Límites Máximos de Residuos (ppm)

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA