

28,00 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:** Benzoyl ureas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vomito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**SAMU: 106 / NEXXT S.A.C.: 3261910**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destruyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática altas.

**BUNDI**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Lufenuron.....50 g/L  
Aditivos.....csp 1L

**Registro PQUA N° XXXX - SENASA**

Titular del registro: NEXXT S.A.C.

Importado y distribuido por:  
**NEXXT S.A.C.**

Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156.  
Urb. El Pino (Piso 1 y 3). San Luis, Lima-Perú  
Tel.: 3261910



Formulador por:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.  
Piso 5, N° 18 Suoove Road Nanjing 210017, P.R. China  
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

N° Lote:  
F. de Form:  
Contenido neto: **1 L**  
F. de Venc:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**BUNDI** es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina, que actúa mayormente por ingestión, las larvas son incapacitadas de mudar, y también dejan de alimentarse.

**BUNDI** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

Para la preparación verter la dosis a usar de **BUNDI** en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar esta al volumen de agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| Cultivo   | Plaga             |                                | Dosis |            | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común      | Nombre científico              | L/ha  | L/200 L    |              |              |
| Espárrago | Comedor de hoja   | <i>Copitarsia corruda</i>      | 0,2   | -          | 7            | 0,02         |
|           | Gusano perforador | <i>Heliothis virescens</i>     | -     | 0,2 - 0,25 |              |              |
|           | Gusano cogollero  | <i>Spodoptera frugiperda</i>   | -     | 0,200      |              |              |
| Páprika   | Gusano perforador | <i>Heliothis virescens</i>     | 0,4   | -          | 7            | 1            |
|           | Gusano del fruto  | <i>Symmetrischema capsicum</i> | -     | 0,2        |              |              |

**PC:** Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones/campaña en el cultivo de paprika (1 campaña/año) y 1 aplicación/campaña en espárrago (2 campañas/año). El momento de aplicación es cuando se empiece a registrar la presencia de la plaga (brotación) y/o cuando se empiece a observar los primeros síntomas de raspado de tallos.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **BUNDI** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



14,60 cm