

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Use el equipo de protección adecuada y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
- Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua.
- Consiga atención médica y muéstrela la etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
Teléf. del titular:
L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC: (01) 382 - 4874

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Trichoderma harzianum 4.653 g/L
(0.45 % p/p, contiene 1.0 x 10¹¹ UFC/ml)
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro e Importador:

L&M Servicios Agrícolas Integrales S.A.C.
Av. Javier Prado Este 488 Piso 7.
San Isidro, Lima
Teléfono: +51 (01) 382 - 4874
www.seragro.net

Formulador:

Ultraquímica Agrícola S.A. de C.V.
Indiana No. 260-604. Col. Ciudad de los Deportes.
Benito Juárez, Ciudad de México, México. CP 03710.
Teléfono: +52 55-55988034
www.ultraquimia.com



Ultraquímica Agrícola S.A. de C.V.

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 5 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECTRUM® TRICO BIO es un fungicida biológico que coloniza el sistema radicular de las plantas (rizósfera), formando una capa protectora contra hongos fitopatógenos. Actúa por antibiosis, microparasitismo y exclusión competitiva por espacio y nutrientes; produce metabolitos y enzimas hidrolíticas que reducen el crecimiento e inhiben el desarrollo de hongos fitopatógenos.

Modo de empleo: Agite el producto antes de usar. Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5. Aplicar vía drench al cuello de la planta o por sistema de riego o goteo. Aplicar el producto durante las primeras horas de la mañana o por la tarde, con el fin de no exponer al hongo a condiciones de temperatura y de radiación adversas. Aplique la solución el mismo día de su preparación. El producto debe ser almacenado en un ambiente fresco en su envase original y cerrados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Fusariosis del Espárrago	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>asparagi</i>	4	N.A.	N.A.

PC: Período de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

SPECTRUM® TRICO BIO, debe aplicarse en formación de brotes laterales/macollamiento cuando se observen los primeros síntomas o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad, se recomienda realizar 3 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año. Las aplicaciones se deben realizar con un intervalo de 7 días. El rango de gasto de agua es de 1500 - 2000 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO

Al ser un producto biológico, no hay periodos de reingreso específicos al área tratada, no hay riesgos asociados al producto para el usuario.

COMPATIBILIDAD

SPECTRUM® TRICO BIO no es compatible con fungicidas ni productos de reacción alcalina o que alteren el rango del pH del agua. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



CUIDADO

