

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- # TURANGA

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Aceite de canela.....	200 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Req. N° - SENASA- PBA- EV

Titular de Registro:

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C.
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,
Miraflores - Lima, Perú
Teléfono: (01) 222 - 2795



Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

Importador y Distribuidor:

NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C.
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,
Miraflores - Lima, Perú
Teléfono: (01) 222 - 2795

No. de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TURANGA es un acaricida biológico en base a aceite de canela. Actúa por contacto de diferentes formas: bloquea los espiráculos provocando sofocación, desecación y muerte, tiene compuestos naturales neurotóxicos, estos también tienen efectos perjudiciales sobre la permeabilidad de la membrana celular e inhiben el crecimiento.

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.15	N.A.	N.A.
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.15 - 0.20	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite máximo de residuos P.C.: Período de carencia N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observa los primeros ataques de la plaga, de preferencia durante los primeros estados ninfales cuando ésta es más susceptible. Se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña por año, con un intervalo de 10 días o cuando se observen reinfestaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada cuando el producto se haya secado completamente después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas más comúnmente utilizados a excepción de abonos foliares y productos a base de cobre y reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en una mezcla aparte.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

