

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

# Romeo®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

## COMPOSICIÓN

Cerevisane ..... 941 g/Kg  
(pared celular de *Saccharomyces cerevisiae* cepa LAS 117)  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Registro N° 0253-SENASA-PBA



**Títular del Registro,  
Importado y Distribuido por:**  
**SUMMIT AGRO SOUTH**  
**AMERICA SPA., SUCURSAL PERU**  
Calle Coronel Andrés Reyes N°360  
Of. 401-A. San Isidro. Lima - Perú  
Teléfono: (511) 444-3096



**Formulado por:**  
**AGRAUXINE S.A.**  
137 rue Gabriel Peri, 59700  
Marcq en Baroeul, Francia

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.35 - 0.5	N.A.	N.A.
	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Curación (días)

N.A.: No aplica

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La aplicación se debe realizar cuando se presenten las condiciones ambientales para el desarrollo del hongo o al inicio de la infestación, desde las etapas fenológicas de brotamiento a desarrollo de frutos, principal época para la aparición de hongos fitopatógenos como Oidium, Mildiu y Botrytis en los cultivos descritos.

Realizar 8 aplicaciones por campaña considerando un intervalo de 5 a 7 días y una campaña al año para los cultivos de arándano y uva de mesa.

## PERÍODO DE REINGRESO

Es posible reingresar 4 horas después de la aplicación o una vez que se ha secado el depósito sobre el follaje.

## COMPATIBILIDAD

Evite todo contacto con agentes muy oxidantes. En caso de dudas, realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar en el equipo aplicador.

## FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en el cultivo y dosis recomendados.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar en áreas secas, frías y bien ventiladas. Mantener alejado del calor. Proteger de la luz solar. Mantener fuera del punto de congelación. Manténgase el recipiente seco. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Conservar únicamente en el recipiente original. Es estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de uso.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de re entrada(reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes”.
- “Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón”.
- “Almacenar el producto en el envase original, etiquetado cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación”.
- “No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos”.
- “No almacenar en casas de habitación”
- “No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes”.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión **NO** INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.
- En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, minuciosamente entre pelos, uñas y pliegues cutáneos. Si la irritación continúa, consulte a un médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deben utilizarse nuevamente. Si la irritación persiste contacte un médico.
- En caso de inhalación: traslade al paciente a un lugar ventilado y manténgalo en reposo. Llevar a un centro asistencial de inmediato.
- Antídoto: No posee antídoto específico. Tratamiento sintomático.

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ROMEO®** es un fungicida sistémico que actúa previamente retrasando el ataque de los hongos. Su ingrediente activo Cerevisane (pared celular de la levadura cepa LAS117) induce fuertemente en la planta mecanismos de defensa, y así prepara a la planta para defenderse contra los hongos.

Modo de empleo: Diluir en un recipiente con agua, la cantidad requerida de **ROMEO®**, agitando fuertemente; luego dejar decantar por unos minutos, antes de verter en el equipo de aplicación o riego, que previamente ha sido llenado con agua hasta completar el nivel necesario para la aplicación. Evite la aplicación a altas temperaturas. En caso de fuertes lluvias en las horas después de la aplicación, repita el tratamiento del producto de nuevo.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SUMMIT AGRO SOUTH AMÉRICA SPA., SUCURSAL PERÚ:

(511) 444-3096 /

SAMU: 106 / CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa:

956740869

