

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Romeo®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Cerevisane 941 g/Kg
(pared celular de *Saccharomyces cerevisiae* cepa LAS 117)
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Registro N° 0253-SENASA-PBA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



SUMMITAGRO

**SUMMIT AGRO SOUTH
AMERICA SPA., SUCURSAL PERU**
Calle Coronel Andrés Reyes N°360
Of. 401-A. San Isidro. Lima - Perú
Teléfono: (511) 444-3096

Formulado por:



AGRAUXINE
137 rue Gabriel Péri, 59700
Marcq en Baroeul. Francia

NO INFLAMABLE NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”



CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.35 - 0.5	N.A.	N.A.
	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	N.A.	N.A.
	Oidium	<i>Erysiphe elevata</i>	0.35 - 0.5	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carencia (días)

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La aplicación se debe realizar cuando se presenten las condiciones para el desarrollo del hongo o al inicio de la infestación, desde las etapas fenológicas de floración a cosecha para Botrytis y de brotación a cosecha para Oidium y Mildiu, principales épocas para la aparición de estos hongos fitopatógenos. Realizar 8 aplicaciones por campaña considerando un intervalo de 5 a 7 días y una campaña al año en los cultivos de vid y arándano.

PERÍODO DE REINGRESO

Es posible reingresar 4 horas después de la aplicación o una vez que se ha secado el depósito sobre el follaje.

COMPATIBILIDAD

Evite todo contacto con agentes muy oxidantes. En caso de dudas, realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar en el equipo aplicador.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en el cultivo y dosis recomendados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar en áreas secas, frías y bien ventiladas. Mantener alejado del calor. Proteger de la luz solar. Mantener fuera del punto de congelación. Manténgase el recipiente seco. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Conservar únicamente en el recipiente original. Es estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN**

- “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de re entrada(reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes”.
- “Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón”.
- “Almacenar el producto en el envase original, etiquetado cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación”.
- “No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos”.
- “No almacenar en casas de habitación”
- “No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,medicinas, bebidas ni forrajes”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.
- En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, minuciosamente entre pelos, uñas y pliegues cutáneos. Si la irritación continúa,consulte a un médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel,lavarse con abundante agua y jabón. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si la irritación persiste contacte un médico.
- En caso de inhalación: traslade al paciente a un lugar ventilado y manténgalo en reposo. Llevar a un centro asistencial de inmediato.
- Antídoto: No posee antídoto específico. Tratamiento sintomático.



CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ROMEO® es un fungicida sistémico que actúa previamente retrasando el ataque de los hongos. Su ingrediente activo Cerevisane (pared celular de la levadura cepa LAS117) induce fuertemente en la planta mecanismos de defensa, y así prepara a la planta para defenderse contra los hongos.

Modo de empleo: Diluir en un recipiente con agua, la cantidad requerida de **ROMEO®**, agitando fuertemente; luego dejar decantar por unos minutos, antes de verter en el equipo de aplicación o riego, que previamente ha sido llenado con agua hasta completar el nivel necesario para la aplicación. Evite la aplicación a altas temperaturas. En caso de fuertes lluvias en las horas después de la aplicación, repita el tratamiento del producto de nuevo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SUMMIT AGRO SOUTH AMÉRICA SPA.,
SUCURSAL PERÚ: (511) 444-3096 /
SAMU: 106 / CICOTOX: (511) 619-7000
IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

