

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebida ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
- Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua.
- Consiga atención médica y muéstrela la etiqueta.

Teléf. Emergencia:

SAMU: 106

Teléf. del titular:

L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC: (01) 382 - 4874

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No permitir animales en el área tratada.

SPECTRUM® PAE L

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Purpureocillium lilacinum.....3.7 g/L
(Contiene 1.0 x 10¹¹ UFC/L)
Aditivosc.s.p.1 L

Reg. N°- 252 SENASA-PBA-ACBM

TITULAR DE REGISTRO:

L&M Servicios Agrícolas Integrales S.A.C

Av. Javier Prado Este 488 Piso 9^o

San Isidro. Lima

Teléfono: +51 (01) 382-4874

E-mail: seragro@seragro.net

FORMULADOR:



Ultraquimia Agrícola S.A. de C.V

Indiana No. 260-604. Col.

Ciudad de los Deportes.

Benito Juárez, Ciudad de México,

México. CP 03710.

Teléfono: +52 55-55988034

www.ultraquimia.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:



Crop Business, S.A.C.

Av. Melgarejo 580, Dpto. 301,

Urb. Santa Patricia 1ra Etapa,

La Molina, Lima – Perú.

Tel. Oficina: 01-3492669 Anexo 1005.

Fecha de Formulación:

N° de Lote

Contenido Neto: 5 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECTRUM® PAE L es un nematocida biológico que actúa por contacto parasitando huevos y sus embriones, estados móviles y hembras sedentarias de los nemátodos, causando deformaciones, destrucción de ovarios y reducción de la eclosión. Produce toxinas que afectan el sistema nervioso y causan deformación en el estilete de los nemátodos que sobreviven, lo que permite reducir el daño y sus poblaciones. El hongo coloniza externamente, produce y libera conidios infectivos que son la fuente del inóculo para continuar infectando nemátodos.

Agite el producto antes de usar. Acondicione el agua en el rango de 5.5 a 7.0. La aplicación del producto puede ser directa al suelo, en drench, por inyección o sistema de riego por goteo. Cuando la aplicación se realice a través del sistema de riego por goteo, deberá aplicarlo en el segundo tercio del riego. Se recomienda hacer las aplicaciones en forma de lavado del suelo al inicio del cultivo. Para una aplicación óptima, el suelo debe estar húmedo, por debajo de su capacidad de campo. Se debe garantizar que la aplicación del producto cubra el área donde se localizan los nemátodos, utilice un volumen adecuado de agua para la aplicación. Realizar las aplicaciones a horas tempranas de la mañana o en la tarde cuando la radiación solar no sea muy fuerte.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	PLAGA		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Pimiento	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	4	N.A	N.A

PC: Periodo de Carenia

NA: No Aplica

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto 2 veces por campaña con un intervalo de 25 días.

PERIODO DE REINGRESO

Al ser un producto biológico, no hay periodos de reingreso específicos al área tratada, no hay riesgos asociados al producto para el usuario.

COMPATIBILIDAD

SPECTRUM® PAE L no es compatible con fungicidas ni productos de reacción alcalina o que alteren el rango del pH del agua.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



CUIDADO

