MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3471 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 100 g

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

® Marca Registrada

PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A
SAMU: 106,
DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837,
Línea directa: 956740869;
CISPROQUIM: 0800-50847.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS. En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En el **cultivo de Palto y vid** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1400 L/ha. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	42	0.01
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	1	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3. MODERADAMENTE PELIGROSO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°3471 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 200 g

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

® Marca Registrada

PELIGRO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE DROKASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106, DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869; CISPROQUIM: 0800-50847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de artrópodos benéficos (polinizadores).
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3.
MODERADAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En los **cultivos de Palto y vid** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1400 L/ha. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
MYZZUS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	42	0.01
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	1	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°3471 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 250 g

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

® Marca Registrada

PELIGRO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE DROKASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106, DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869; CISPROQUIM: 0800-50847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de artrópodos benéficos (polinizadores).
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3.
MODERADAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En los **cultivos de Palto y vid** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1400 L/ha. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
MYZZUS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	42	0.01
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	1	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3471 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 g

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

® Marca Registrada

PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A
SAMU: 106,
DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837,
Línea directa: 956740869;
CISPROQUIM: 0800-50847.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS. En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En el **cultivo de Palto y vid** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1400 L/ha. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	42	0.01
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	1	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3. MODERADAMENTE PELIGROSO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°3471 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 kg

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

® Marca Registrada

PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto especifico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106, DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869; CISPROQUIM: 0800-50847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de artrópodos benéficos (polinizadores).
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3.
MODERADAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En los **cultivos de Palto y vid** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1400 L/ha. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
MYZZUS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	42	0.01
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	1	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°3471 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 5 kg

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

® Marca Registrada

PELIGRO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106, DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869; CISPROQUIM: 0800-50847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de artrópodos benéficos (polinizadores).
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3.
MODERADAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En los **cultivos de Palto y vid** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1400 L/ha. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
MYZZUS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	42	0.01
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	1	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°3471 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 25 kg

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

® Marca Registrada

PELIGRO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106, DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869; CISPROQUIM: 0800-50847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de artrópodos benéficos (polinizadores).
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3.
MODERADAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En los **cultivos de Palto y vid** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1400 L/ha. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
MYZZUS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha	días	ppm
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	42	0.01
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	1	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Gránulos
- Color : Blanquecino
- Olor : Olor característico
- Densidad : 0.5 - 1.0 g/cm^3 a 20°C
- pH : 5 - 9

Aditivos de Importancia Toxicológica: Ninguno.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Capacidad	Material
100g, 200g, 250g, 500g, 1kg 5kg, 25kg	Bolsa de trilaminada

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A. Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9, Magdalena del Mar. Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing, China

ENVASADO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Cajamarquilla (1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote Parcela 64, Lt B. Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.

"Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: guantes de goma, delantal, careta de protección.
Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado del fuego directo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106, DROKASA PERÚ S.A.: (511) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869; CISPROQUIM: 0800-50847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de artrópodos benéficos (polinizadores).
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

OTRAS INSTRUCCIONES
Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacíos: Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

En caso de derrames: se puede absorber el producto con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlos en lugares destinados por las autoridades locales para ello. Tener cuidado de no contaminar fuentes de agua.

PELIGRO

EXCLUSIVO PARA USO EN EL SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Época de aplicación: MYZZUS debe ser aplicado en la etapa vegetativa del cultivo, cuando la plaga se encuentre en los primeros estadio larvales y se observen los primeros daños en el cultivo.

Frecuencia y época de aplicación:
- No aplicar en época de floración.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

CUADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS		PC	LMR
	Nombre Comun	Nombre Cientifico	Kg/200L	Kg/ha	(días)	(ppm)
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Palto	Queresa	*Fiornia fiornine*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	42	0.01
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.05 - 0.07	0.35 - 0.49	1	0.5

P.C.: Periodo de carencia
LMR: Limite maximo de residuos

Modo de acción: MYZZUS es un insecticida que contiene como ingrediente activo Acetamiprid con modo de acción sistémico, actividad translaminar además actúa por contacto y estomacalmente sobre los insectos. Es aplicado por vía foliar y al suelo, usado para el control de Hemípteros, especialmente áfidos, Thysanopteros y lepidópteros que atacan a los cultivos.

Mecanismo de acción: MYZZUS es un insecticida Acetamiprid es un agonista del receptor nicotínico de acetilcolina, que afecta las sinapsis en el sistema nervioso central del insecto.

Incompatibilidad: MYZZUS es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con los de reacción alcalina, aminoácidos y oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

Efectos sobre otros cultivos: No se ha observado ningún efecto negativo sobre otro cultivos donde se haya aplicado el producto.

Variedades susceptibles: Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en nuestro país.

Número máximo de aplicaciones sucesivas por campaña: En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña y como máximo dos aplicaciones por año, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En el **cultivo de Palto y Vid** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1400 L/ha. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

Método de aplicación: MYZZUS debe aplicarse en aspersiones foliares tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien el follaje. Utilizar agua a pH 5.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual, a motor y con bomba o pistola de alta presión.

Tamaño de gota: Usar boquilla de gota fina Tee Jet 8004.

Período de reingreso: No ingresee a las áreas tratadas hasta después de 24 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3.
MODERADAMENTE PELIGROSO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG
Grupo Químico: NEONICOTINOIDE
Registro PQUA N° 3471 - SENASA

NOMBRE COMÚN:
- Acetamiprid ..... 700 g/kg
- Aditivos c.s.p. ..... 1 kg

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

FÓRMULA EMPÍRICA Y PESO MOLECULAR:
$C_{10}H_{11}ClN_4$
222.67 g/mol

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



ACETAMIPRID

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DUWEST DROKASA PERU S.A.

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

® Marca Registrada

PELIGRO