MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3471 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.
N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical
Zone, Nanjing, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 g

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

® Marca Registrada

PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A
SAMU: 106,
DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837,
Línea directa: 956740869;
CISPROQUIM: 0800-50847.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS. En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el **cultivo de mandarina** se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga. En el **cultivo de Arándano** se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña/año durante el desarrollo vegetativo del cultivo, considerando un gasto de agua promedio de 1200 L/ha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC dias	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.075 - 0.1	0.375 - 0.5	14	1.0
Arándano	Piojo harinoso	*Pseudococcus longispinus*	0.05 - 0.07	0.30 - 0.42	1	2.0

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3. MODERADAMENTE PELIGROSO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA