

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SHINZO WP

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

| | |
|--|-------------|
| Extracto de Rheum officinale..... | 50 g/kg |
| Bacillus subtilis (equivalent to 1×10^{10} CFU/gr)..... | 50 g/kg |
| Aditivos | c.s.p. 1 kg |

Reg. N°0256 – SENASA - PPA

Titular del registro:

SINERIA PERU S.A.C.

Av. Caminos del Inca 131 Int. 204, Urb. Chacarilla del Estanque Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono +51 945138049 / www.sineria.com



Formulado por:

SINERIA HOLLAND BV.

Randwycksingel 20-A015, 6229 EE Maastricht,
The Netherlands
Tel. +31 (0)43 2041120 / www.sineria.com



Importado y Distribuido por:

AG TEN E.I.R.L.

Urb. La Laguna del Chipe A5 II Etapa, Int. 301 Piura – Perú
Correo: ventas@agtendelperu.com/www.agtendelperu.com

FECHA DE FORMULACIÓN:

N° DE LOTE:

CONTENIDO NETO: 100g, 200g, 500g

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS"**

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo: Fungicida biológico

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Teléfono de la empresa: +51 945138049

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (Kg/Ha) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|----------|--------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Uva | Mildiu | <i>Plasmopara viticola</i> | 1.5 - 2.0 | N.A. | N.A. |
| Arándano | Moho gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 1.5 | N.A. | N.A. |

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede ser utilizado de manera preventiva o al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Considerar hasta 02 aplicaciones por campaña y 01 campaña por año para arándano y vid.
- Considerar un intervalo de aplicación de 7 a 10 días.
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SHINZO WP es compatible con sustancias alcalina, sustancias oxidantes, e incompatible con sustancias reductoras. Compatible con productos fertilizantes y fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

