

28 cm

15 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Pyridine - IGR**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o a cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
ESSALUD: 0801 - 10200  
CINNAMON SAC: 997220509

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# MAXIMUS 10 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**Composición:**

Pyriproxyfen..... 100 g/L  
Aditivos..... csp 1 L

**Reg. PQUA Nº 3481-SENASA**

Titular del Registro, importado y distribuido por:

**CINNAMON S.A.C**  
Av. Flora Tristán 158. Dpto. 103  
Lima 15024 - Perú  
Telf: 997220509  
cinnamonsac@gmail.com



Formulado por:

**Shanghai CBAGRO Co., Ltd**  
No. 1088 Fanghe RD, Minhang District  
Shanghai - China  
Telf: +86 18321303461

**Contenido Neto: 1L**

Lote Nº:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy Tóxico para  
organismos  
acuáticos



**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MAXIMUS 10 EC** imita una hormona natural (hormona juvenil) en los insectos y altera la fisiología de la morfogénesis, reproducción y embriogénesis de los insectos. Actúa por contacto e ingestión. Acción translaminar en la planta.

**MAXIMUS 10 EC** se aplica en aspersión con equipo aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente y aplicar hasta lograr una buena cobertura de las plantas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.2	21	0.05
PALTO	Queresa del palto	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.2	14	0.05
ARÁNDANO	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.2	7	0.05

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos

**PC:** Período de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Plique al inicio de la infestación de la plaga. Se recomienda realizar 1 aplicación de MAXIMUS 10 EC por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

**MAXIMUS 10 EC** es compatible con productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

