

SIZE: 14.0 x 28.0 cm

12/10/2023

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar:

**SAMU: 106 ó Titular NOVAGRO-AG S.A.C.: +51 (044) 273330**

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de aplicación.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**EXTRACTO VEGETAL**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**DISPERSIÓN OLEOSA (OD)**

#### COMPOSICIÓN:

Aceite de ajos.....400 g/L  
Aceite de soya.....527 g/L  
Aceite de algodón.....3 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

**Registro PBUA N° XXX - SENASA**

#### TITULAR DEL REGISTRO:

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.  
Teléfono: +51 (044) 273330, ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

#### FORMULADOR:

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.  
Teléfono: +51 (044) 273330, ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

#### DISTRIBUIDOR:

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.  
Teléfono: +51 (044) 273330, ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



"Aceleramos la transición hacia la producción de frutas  
y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor"

Fecha de formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **1 L**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**MITUYO** es una mezcla de aceites vegetales que actúa como insecticida. Su fórmula única está hecha a base de los más finos aceites naturales. Por los componentes del ajo actúa en el sistema nervioso de los insectos, provocando confusión en los sentidos y su desorientación. **MITUYO** le cambia a las plantas el olor agradable para los insectos por olores molestos para los mismos, sin afectar el olor y sabor de las frutas y vegetales.

#### SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Hacer una mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo   | Plagas                  |                                      | Dosis     |         | PC   | LMR  |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|------|------|
|           | Nombre común            | Nombre científico                    | L/Ha      | ml/200L |      |      |
| Alcachofa | Mosca minadora          | <i>Liriomyza huidobrensis</i>        | 0.81      | 400     | N.A. | N.A. |
| Arándano  | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>                | 0.60      | 300     | N.A. | N.A. |
|           | Piojo harinoso          | <i>Pseudococcus longispinus</i>      | 1.6 - 1.8 | 400-500 | N.A. | N.A. |
| Banano    | Trips del plátano       | <i>Chaetanaphothrips signipennis</i> | 0.8 - 1.0 | 400-500 | N.A. | N.A. |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifila</i>         | 0.92      | 200     | N.A. | N.A. |
|           | Trips                   | <i>Thrips tabaci</i>                 | 0.90      | 300     | N.A. | N.A. |
| Frijol    | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>                | 0.45      | 300     | N.A. | N.A. |
| Fresa     | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>                | 0.45      | 300     | N.A. | N.A. |
| Granado   | Trips                   | <i>Thrips tabaci</i>                 | 1.8-3.0   | 300-500 | N.A. | N.A. |
| Holantao  | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifila</i>         | 0.3       | 200     | N.A. | N.A. |
| Mandarina | Pulgón de los cítricos  | <i>Aphis spiraecola</i>              | 1.05      | 300     | N.A. | N.A. |
| Pimiento  | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifila</i>         | 0.4-0.6   | 200-300 | N.A. | N.A. |
| Vid       | Trips                   | <i>Thrips tabaci</i>                 | 2.0-2.6   | 400-500 | N.A. | N.A. |

PC: Periodo de carencia en días

N.A.: No aplica

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado en cualquier estado fenológico del cultivo sin restricciones en presencia de la plaga o de forma preventiva.

#### PERIODO DE REINGRESO

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

#### COMPATIBILIDAD

**MITUYO** no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos y puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 - 6.0.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



**PRECAUCIÓN**

