

# SANADOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

## COMPOSICIÓN

Fosetyl-Aluminium..... 800 g/kg  
Aditivos ..... csp 1 kg

**Reg. PQUA N° 591 - SENASA**

### TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991 Piso 9,  
Magdalena del Mar. Lima - Perú.  
Teléfono: 501-1000



### FABRICADO Y FORMULADO POR:

KINGTAI CHEMICALS CO., LTD.  
9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development Zone  
Binjiang Hangzhou, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

**CONTENIDO NETO: 500 g**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- "Este producto es nocivo si se ingiere"
- Puede causar sensibilización de la piel por contacto
- Causa irritación moderada a los ojos.
- "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas"
- "Evite contacto con la piel y la ropa"
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Sal de ácido fosfórico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:  
SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A. Telf.: (01) 501 -1000,  
CETOX Línea gratuita de Emergencia Telf.: 0800-71911
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes o envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SANADOR, es un fungicida preventivo y curativo contra las enfermedades causadas por oomicetos. Es sistémico, fácilmente absorbido por las plantas y rápidamente transportado vía xilema y floema, incluso hasta raíces y brotes que se forman después de las aplicaciones.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

SANADOR, es utilizado en forma preventiva cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad, de preferencia al inicio del brotamiento. Se recomienda 1 aplicación/campaña/año.

### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada sin protección hasta 12 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

SANADOR, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común excepto con los de reacción alcalina. Puede ser incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables y productos a base de cobre.

### FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

### CUADRO DE USOS Y DOSIS

| CULTIVO   | ENFERMEDAD          |                                | DOSIS<br>kg/200L | PC<br>días | LMR<br>ppm |
|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|
|           | NOMBRE COMÚN        | NOMBRE CIENTÍFICO              |                  |            |            |
| Palta     | Pudrición radicular | <i>Phytophthora cinnamomi</i>  | 0.5*             | 0.5**      | 50         |
| Vid       | Mildiu              | <i>Plasmopara viticola</i>     | 0.5 - 0.6        | 21         | 100        |
| Páprika   | Azul o Hielo        | <i>Phytophthora capsici</i>    | 0.75 - 1.0       | 14         | 130        |
| Cebolla   | Mildiu              | <i>Peronospora destructor</i>  | 0.75             | 7          | 50         |
| Mandarina | Gomosis del cuello  | <i>Phytophthora nicotianae</i> | 0.5 - 0.6*       | 14         | 75         |
| Arándano  | Pudrición radicular | <i>Phytophthora cinnamomi</i>  | 0.75 - 1.0       | 0          | 2          |

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia  
(\*SANADOR se prepara diluyendo la dosis en un cilindro de 200 L, de ésta solución se aplica 4 L por árbol dirigido al cuello de planta.  
(\*\*)12 horas

