

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- ligroso si es inhalado. Evite respirar (Polvo o aspersión).
- alice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- lice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las
- terías 24 horas después de la aplicación.
- pués de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- nacerar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- gún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para
- sumo.

FRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- upo químico: Anilino pirimidine (cyprodinil), Phenylpyrrole (fludioxonil).
- caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la
- jela.
- caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona si la persona
- inconsciente o padece convulsiones. En caso de vomito espontáneo, haga que víctima se incline
- a adiante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación de vomito, enjuague la boca y
- insinar agua. Lleve al paciente inmediatamente al centro médico más cercano y mostrar la etiqueta.
- caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos,
- ando que los párpados estén levantados. Acudir al medica inmediatamente si la irritación persiste.
- caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua
- ón.
- caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- dar respiración artificial si fuera necesario.
- a al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 678-9544

DICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- gún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de
- el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino
- uesto por la autoridad competente, para su gestión.

IDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- ligroso para los organismos acuáticos.
- contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos y restos de aplicación.
- spetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades
- les para este fin.

PURSUT

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición
Cyprodinil 375 g/kg
Fludioxonil 250 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

POUA N° -SENASA

IUPAC: Cyprodinil: 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Fludioxonil: 4-(1,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formula empírica: Cyprodinil: C₁₄H₁₄N₄ Fludioxonil: C₈H₆F₂N₂O₂
Formula estructural:



N° CAS: Cyprodinil: 121552-61-2, Fludioxonil: 131347-86-1
Peso molecular: Cyprodinil: 225.29, Fludioxonil: 248.19
Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno
Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 0.5, 0.1, 0.12, 0.5, 1.5, 10, 20 Kg

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCIAS S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (51) 639-9311

FORMULADOR:

SHANGDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China

Tel: 86-531-88875231

Fax: 86-531-88875232

E-mail: rainbowagro_rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PURSUT es un fungicida específico para combatir el mocho gris (Botrytis cinerea): sistémico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultante de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias.

PURSUT puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (motocicla), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico			
Arándano	Podredumbre gris / Mocho gris	Botrytis cinerea	0.8	1	10*
Mandarina	Podredumbre gris / Mocho gris	Botrytis cinerea	0.8	15	2** 0.02* 0.02**
Pimiento	Podredumbre gris / Mocho gris	Botrytis cinerea	0.8-1.0	7	0.2* 0.05**
Palto	Podredumbre gris / Mocho gris	Botrytis cinerea	0.8	N.A.	1.0* 1.5**
Vid	Podredumbre gris / Mocho gris	Botrytis cinerea	1.0	7	3.0* 4.0**

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

Cyprodinil* Fludioxonil**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar PURSUT dirigido al follaje del cultivo, cuando este se encuentre en estado de floración, previa evaluación de la enfermedad en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la misma.

- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña como máximo.
- Es importante rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PURSUT es compatible con la mayoría de producto sanitarios de uso común.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.