

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia por 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión: no inducir el vómito, beber agua y acudir al servicio de salud más cercano. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Efectuar tratamiento sintomático.

En caso de inhalación: llevar a la persona a áreas ventiladas. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial. Proporcione asistencia médica.

Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, FARMEX: 6306400, CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No permitir animales en el área tratada.

Exilis®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

6-benzyladenine.....20.0 g/L
Aditivosc.s.p. 1.0 L

RCP N° 131-SENASA

Titular del Registro:

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,
San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: 630-6400

Formulado por:

Fine Americans INC.
1850 Mt. Diablo Blvd, Suite 670 Walnut
Creek CA 94596, USA

Importado y distribuido por:



FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,
San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: (01) 630-6400

Contenido neto:

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EXILIS® es un regulador de crecimiento que aumenta la actividad fotosintética, induce la división celular, estimula la formación de brotes laterales y promueve el crecimiento de los frutos.

Sistemas de preparación y aplicación

Para la preparación de la mezcla, llenar el tanque o recipiente con agua hasta la mitad. Agregar la dosis recomendada de **EXILIS®**, completar con agua hasta llenar el depósito y lograr una mezcla uniforme del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Recomendación de aplicación	Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
		L/ha		
Arándano	A la caída de pétalos y 14 días después.	2	31	0.01
Mandarina	Inicios de botoneo, floración y final de floración.	3	30	0.01

PC: Periodo de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

*El gasto máximo de agua es de 1200 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Arándano: realizar una primera aplicación a la caída de pétalos (fines de floración e inicio de cuajado), y la segunda 14 días después de la primera.

Mandarina: realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, aplicar a inicios de botoneo, plena floración y culminar a finales de la floración.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar a un campo aplicado hasta 12 horas después de aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros agroquímicos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



CUIDADO

