

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
Este producto es ligeramente tóxico, por lo que en su manejo se necesitan tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas como:
- Leer detenidamente la etiqueta antes de usar el producto.
 - Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
 - No comer, fumar, ni beber durante la preparación de la mezcla y la aplicación.
 - No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
 - Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
 - Guardar en lugar fresco y seco bajo llave.
 - Evitese la contaminación de las fuentes de agua, estanques, drenajes.
 - Mantener bajo llave, fuera del alcance de los niños.
 - Utilizar ropa de protección: botas, guantes, mascarillas y overol en la aplicación de la mezcla

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
Grupo Químico: Carbohidratos (azúcares ácidos)
- Evite la inhalación o el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas. No inhale la niebla de aspersión.
- En caso de ingestión, llevar al médico y mostrarle la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua fresca.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Biogen Agro S.A.C.: (511) 612-6565

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para animales domésticos. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



ZELENDOR

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:
Extracto Vegetal (*Saccharum officinarum*).....66.1g/L
Ácidos Urónicos.....14.1g/L
Aditivos Naturales
(Melaza pasteurizada, agua desionizada) c.s.p.....1 L

Reg. N° xxx-SENASA



Titular del Registro y Formulator:
 BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes 311. Urb. Santa Raquel 2da Etapa. Ate, Lima-Perú.
Tel: (511) 612-6565



Distribuidor autorizado:
TALEX PERU S.A.C.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Telf.: 612-6565
R.U.C. N° 20513013826

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido
Neto: 1L

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ZELENDOR, es un fungicida biológico en base al extracto de caña (*Saccharum officinarum*) cuyo ingrediente activo son los ácidos urónicos.
ZELENDOR, se usa sobre el follaje en pulverización; y dirigido a la raíz, en drench o por sistema de riego tecnificado. En aplicaciones al follaje recomendamos calibrar el equipo para obtener el gasto de agua que permita el adecuado cubrimiento y en sistemas de riego tecnificado, aplicar en el tercer cuarto del tiempo de riego.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR ppm
	N. Común	N. Científico			
VID	Oídio	<i>Erysiphe necator</i>	4	N.A.	*
	Mildíu	<i>Plasmopara viticola</i>	4	N.A.	*
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	4	N.A.	N.A.
	Pudrición ácida	<i>Acetobacter sp</i>	3	N.A.	N.A.
PAPRIKA	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	4	N.A.	*
ARÁNDANO	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	4	N.A.	N.A.
PALTO	Muerte descendente	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	4	N.A.	*
	Tristeza del Palo	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	4	N.A.	N.A.
	Pudrición Negra de Raicillas	<i>Cylindrocarpum destructans</i>	4	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm). N.A.: No Aplica
(*): No hay restricciones

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **ZELENDOR** cuando el patógeno presente niveles iniciales de infestación o en presencia del mismo, distanciando las aplicaciones de 7 - 10 días entre aplicación, dependiendo de la presión de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: Por ser un producto a base de componentes naturales, no tiene restricciones en cuanto al periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD:
ZELENDOR, es compatible con la mayoría de plaguicidas y nutrientes agrícolas comúnmente usados en los cultivos, con excepción de los productos de reacción alcalina. Es importante antes de efectuar la mezcla hacer una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: el producto aplicado a la dosis de etiqueta no causa ningún daño fitotóxico.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

