

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# CURASEMILLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)

**COMPOSICION:**

Thiamethoxam.....	262.5 g/L
Difenoconazole.....	.25 g/L
Fludioxonil.....	.25 g/L
Aditivos.....	c.s.p.1 L

**Reg. PQUA N° .....-SENASA**

**Títular del registro: PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C**

Av. Tomas Ramsey 930, Oficina N° 1210, Magdalena del Mar,  
Lima, Perú  
Teléfono: (01) 222-2795

**Formulador: NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 10-6, Shidai Square, No. 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

**Importador y Distribuidor: NGC AGROSCIENCES PERÚ S.A.C.**

Calle Enrique Palacios 360, Oficina N° 505, Miraflores,  
Lima, Perú  
Teléfono: (01) 222-2795



**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**

**Contenido Neto: 4 L**

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TOXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS**



**PELIGRO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Neonicotinoide, Triazol y Fenilpirrol.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: (01) 222-2795**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES**

**VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Modo y mecanismo de acción**

**CURASEMILLA** es un fungicida de amplio espectro, para el tratamiento de semillas, con actividad sistémica vía radicular y largo efecto residual.

**Modo de empleo**

Para la preparación de la mezcla, agitar el producto antes de abrir el envase, añadir agua al recipiente en donde se prepara la mezcla hasta la mitad del volumen total, agregar luego la cantidad necesaria de **CURASEMILLA** según la cantidad de semilla a tratar, agitar para asegurar una mezcla homogénea y completar con agua hasta el volumen total. Usar siempre agua limpia.

**CURASEMILLA** puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de semillas.

Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

La impregnación de la semilla debe ser realizada en dilución con agua a razón de 15 cc/kg de semilla.

El momento de aplicación puede ser después de del remejo o después del abrigado de la semilla.

Mezclar primero los productos con agua y por último **CURASEMILLA**.

Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10 °C o superiores a 30 °C.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis (ml/kg de semilla)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.5 - 2.0	NA	0.01 <sup>1</sup> 8 <sup>2</sup> 0.01 <sup>3</sup>

PC: Período de Carencia (días)

N.A.: No Aplica

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm) <sup>1</sup> Thiamethoxam, <sup>2</sup> Difenconazole, <sup>3</sup> Fludioxonil

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una aplicación al momento de la siembra.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No corresponde indicar periodo de reingreso, debido a la naturaleza de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**CURASEMILLA** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. Compatible con preparaciones de cubrimiento de semillas a base de polímeros y con formulaciones WS/FS de reacción neutra usada para tratar semillas. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas, para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**

