**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

# Bupro-Forte

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

## POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Buprofezin..... 250 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p 1 Kg

**Reg. PQUA N° 3271-SENASA**

**Titular del registro, Importador y Distribuidor:**
**NGC AGROSCIENCES PERÚ S.A.C**
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,
Miraflores, Lima, Perú.
Teléfono: (01) 222-2795

**Formulador**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

**CONTENIDO NETO: 25 KG**

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Thiadiazine.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No dar nada por vía oral si el paciente se encuentra inconsciente.
- En caso de irritación ocular: Lavar los ojos con los párpados levantados, con abundante agua durante 15 minutos. Remover lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de irritación dermal: Remover toda la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente del sitio de intoxicación, llevarlo a un lugar ventilado y dejarlo en reposo. Si presenta dificultades para respirar brindarle respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico para este producto. El tratamiento es sintomático.
- **Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106, NGC AGROSCIENCES PERÚ S.A.C: (01) 222-2795.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**BUPRO-FORTE** es un insecticida no sistémico con acción de contacto y estomacal. Es un inhibidor de la síntesis de quitina, suprime el proceso de ecdisis en el insecto inmaduro. **BUPRO-FORTE** es un insecticida que se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua, siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVOS | PLAGA | | DOSIS | | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | g/cil | kg/ha | (días) | (ppm) |
| Mandarina | Queresa redonda | *Selenaspidus articulatus* | 200 | 1 | 14 | 1 |
| Naranja | Queresa común | *Lepidosaphes beckii* | 200 | 1 | 14 | 1 |
| | Mosca blanca | *Aleurothrixus floccosus* | 100 | 0.5 | 14 | 1 |
| Olivo | Queresa móvil | *Praelongorthezia olivicola* | 200 | 1 | 14 | 5 |
| Melocotonero | Queresa blanca | *Pseudoaulacaspis pentagona* | 200 | 1 | 14 | 0.7 |
| Tomate | Queresa blanca | *Bemisia tabaci* | 175 | 0.35 | 14 | 1 |
| Palto | Queresa coma amarillenta | *Fiorinia fioriniae* | 200 | 1 | 45 | 0.05 |
| Mango | Queresa pulverulenta | *Protopulvinaria pyriformis* | 200 | 1 | 14 | 0.1 |
| Vid | Mosca blanca | *Bemisia tabaci* | - | 1 | 30 | 1 |
| | Cochinilla harinosa | *Planococcus citri* | 200 | 1 | 30 | 1 |

**PC:** Período de carencias en días. **LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Se considera hasta dos (02) aplicaciones por campaña como máximo y una frecuencia de aplicaciones de 21 días.
**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.
**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas orgánicos de síntesis con la excepción de productos de reacción alcalina.
**FITOTOXICIDAD. BUPRO-FORTE** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.
**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA