

14.5 ± 0.3 cm

2.2 cm

1.5 ± 0.3 48.0 ± 0.3 cm 1.5 ± 0.3

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es Dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Triazine.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 ESSALUD: 0801-10200
CICOTOX: 0800-13040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PAKATAN® 500FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Ametryn 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400.

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCHAM AGRO CO. LTD.
17-19th Fl. N° 33 Henan Road (S),
Shanghai. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN® 500 FW es absorbido por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200L		
Caña de Azúcar	Pata de gallina Pega pega Cadillo Chamico Verdolaga Amor seco Cerraja Yuyo	<i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Amaranthus sp.</i>	4.0 - 6.0	-	N.A.	0.05
Piña	Pata de gallina Verdolaga Pichana	<i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Sida paniculata</i>	-	1.5 - 2.0	160	0.05

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN® 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplee en mezcla con humectante (EXTRA VON) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas

P.C.: Período de carencia. N.A.: No aplica L.M.R.: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aun cuando PAKATAN® 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcance un desarrollo máximo de 5-10 cm.

Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: PAKATAN® 500 FW es incompatible con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



48.0 ± 0.3 cm

1.5 ± 0.3

1.5 ± 0.3

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es Dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Triazine.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 ESSALUD: 0801-10200
CICOTOX: 0800-13040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PAKATAN® 500FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Ametryn 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400.

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:

SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de **PAKATAN® 500 FW** es absorbido por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200L		
Caña de Azúcar	Pata de gallina Pega pega Cadillo Chamico Verdolaga Amor seco Cerraja Yuyo	<i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Amaranthus sp.</i>	4.0 - 6.0	-	N.A.	0.05
Piña	Pata de gallina Verdolaga Pichana	<i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Sida paniculata</i>	-	1.5 - 2.0	160	0.05

Con el cultivo ya emergido, es preferible que **PAKATAN® 500 FW** sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplee en mezcla con humectante (EXTRAVÓN) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas

P.C.: Período de carencia.

N.A.: No aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aun cuando **PAKATAN® 500 FW** ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcance un desarrollo máximo de 5-10 cm.

Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: **PAKATAN® 500 FW** es incompatible con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



14.5 ± 0.3 cm

2.2 cm

1.5 ± 0.3

48.0 ± 0.3 cm

1.5 ± 0.3

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es Dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Triazine.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 ESSALUD: 0801-10200
CICOTOX: 0800-13040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PAKATAN®
500FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Ametryn 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogr^{um}

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400.

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE
AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou. Zhejiang Province. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN® 500 FW es absorbido por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200L		
Caña de Azúcar	Pata de gallina Pega pega Cadillo Chamico Verdolaga Amor seco Cerraja Yuyo	<i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Amaranthus sp.</i>	4.0 - 6.0	-	N.A.	0.05
Piña	Pata de gallina Verdolaga Pichana	<i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Sida paniculata</i>	-	1.5 - 2.0	160	0.05

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN® 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplee en mezcla con humectante (EXTRAVON®) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas

P.C.: Período de carencia.

N.A.: No aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aun cuando PAKATAN® 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcance un desarrollo máximo de 5-10 cm.

Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: PAKATAN® 500 FW es incompatible con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

