

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU 106, BIOGENAGRO S.A. 01 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ALCHAY®

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Extracto de canela 700 g/L
Aditivos csp 1L

REG.PBA-EV N° XXX-SENASA



Titular del Registro, Formador:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565



Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565
R.U.C. N° 20307150981

Fecha de Formulación:
Lote N°:
Contenido Neto: 200 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ALCHAY® es un fungicida acaricida de origen natural, de amplio espectro y elevada selectividad. Actúa por contacto contra los ácaros y hongos y es preventivo contra los hongos. Actúa, afectando la producción de energía de la plaga.
ALCHAY® se aplica en aspersión, diluido en agua empleando equipos de aplicación terrestre manual, a motor o a tracción.

Modo de preparación: llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de ALCHAY®, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, agitando la solución constantemente. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Cil 200 L		
ARÁNDANO	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6	N.A.	N.A.
PALTO	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.5	N.A.	N.A.
PIMIENTO	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	N.A.	N.A.
VID	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	1.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En aplicaciones preventivas de enfermedades o en infestaciones iniciales aplicar con una frecuencia de 10 a 14 días. En condiciones que favorezcan el desarrollo de la plaga o infestaciones altas, acortar la frecuencia a 5 a 7 días. Aplicar ALCHAY® durante las primeras horas del día o al atardecer.

PERIODO DE REINGRESO:

Después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm