

Longitud Total 28.9 cm.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**Teléfono de emergencia: SAMU 106, BIOGENAGRO S.A. 01 6126565**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ALCHAY®

**EXTRACTO VEGETAL**

**FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**COMPOSICIÓN:**

Extracto de canela ..... 700 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

**REG.PBA-EV N° XXX-SENASA**



Titular del Registro, Formulador:  
**BIOGEN AGRO S.A.C.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telf.: 612-6565



Distribuidor:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú  
Telf.: 612-6565  
R.U.C. N° 20307150981

Fecha de Formulación:  
Lote N°:  
**Contenido Neto: 4 L**  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

ALCHAY® es un fungicida acaricida de origen natural, de amplio espectro y elevada selectividad. Actúa por contacto contra los ácaros y hongos y es preventivo contra los hongos. Actúa, afectando la producción de energía de la plaga. ALCHAY® se aplica en aspersión, diluido en agua empleando equipos de aplicación terrestre manual, a motor o a tracción.

**Modo de preparación:** llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de ALCHAY®, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, agitando la solución constantemente. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.

**"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/Cil 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARÁNDANO	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6	N.A.	N.A.
PALTO	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.5	N.A.	N.A.
PIMIENTO	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	N.A.	N.A.
VID	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	1.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia      L.M.R. Límite máximo de residuos      NA: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

En aplicaciones preventivas de enfermedades o en infestaciones iniciales aplicar con una frecuencia de 10 a 14 días. En condiciones que favorezcan el desarrollo de la plaga o infestaciones altas, acortar la frecuencia a 5 a 7 días. Aplicar ALCHAY® durante las primeras horas del día o al atardecer.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Después de 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con los plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**PRECAUCIÓN**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

Altura Total 13.5 cm.