

200L

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si es ingerido.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico beta-cyfluthrin: Pyrethroids

Grupo químico imidacloprid: Neonicotinoids

- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente. No dar nada de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua corriente durante 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas
- No aplicar en época de floración del cultivo
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes, evitar deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de abejas.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de 10 metros hacia cuerpos de agua.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

RAINPRITA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

DISPERSION EN ACEITE - OD

COMPOSICIÓN:

Beta-cyfluthrin..... 90 g/L

Imidacloprid..... 210 g/L

Aditivos..... C.s.p. 1L

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 678-9544



FORMULADOR:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

No 8 Haipubei road, Pingdu Xinde Eco-Chemical Science and

Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China

Teléfono: +86-532 - 68081298

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAINPRITA es un insecticida que tiene como ingredientes activos a Imidacloprid, que es un insecticida sistémico y actúa por contacto e ingestión, y Beta-cyfluthrin que, si bien no es un insecticida sistémico, sin embargo, la sustancia permanece adherida a la superficie de la hoja después de la aplicación, por lo que las plagas que atacan los cultivos algunos días después aún están controladas, tiene acción por contacto y estomacal. Ambos actúan sobre el sistema nervioso de los insectos.

Agitar el contenido de RAINPRITA en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus	0.25	-	7	0.02* 0.01**
Pimiento	Mosquita de los brotes	Prodioplosis longifila	-	0.6 - 0.75	7	0.2* 1.0**

*Bifenthrin **Imidacloprid

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo dos aplicaciones por campaña del producto RAINPRITA, previa evaluación del campo y en presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

RAINPRITA es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

RAINPRITA no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"



PELIGRO



200L

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si es ingerido.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico beta-cyfluthrin: Pyrethroids

Grupo químico imidacloprid: Neonicotinoids

- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente. No dar nada de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua corriente durante 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposité el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas
- No aplicar en época de floración del cultivo
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes, evitar deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de abejas.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de 10 metros hacia cuerpos de agua.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

RAINPRITA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

DISPERSION EN ACEITE - OD

COMPOSICIÓN:

Beta-cyfluthrin..... 90 g/L
Imidacloprid..... 210 g/L
Aditivos..... C.s.p. 1L

PQA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 678-9544



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737,

China

Tel: 86-531-88875231 Fax: 86-531-88875232

E-mail: rainbowagro_rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAINPRITA es un insecticida que tiene como ingredientes activos a Imidacloprid, que es un insecticida sistémico y actúa por contacto e ingestión, y Beta-cyfluthrin que, si bien no es un insecticida sistémico, sin embargo, la sustancia permanece adherida a la superficie de la hoja después de la aplicación, por lo que las plagas que atacan los cultivos algunos días después aún están controladas, tiene acción por contacto y estomacal. Ambos actúan sobre el sistema nervioso de los insectos.

Agitar el contenido de RAINPRITA en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus	0.25	-	7	0.02* 0.01**
Pimiento	Mosquita de los brotes	Prodioplosis longifila	-	0.6 - 0.75	7	0.2* 1.0**

*Bifenthrin **Imidacloprid

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo dos aplicaciones por campaña del producto RAINPRITA, previa evaluación del campo y en presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

RAINPRITA es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

RAINPRITA no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"



PELIGRO

