

Acethion® 75 PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Acephate, 750 g/kg y Aditivos, csp 1 kg

Reg. PQUA N° 2670-SENASA

Titular del Registro:

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Importador y Distribuidor:

AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000



Formulado por :

NINGBO GENERIC

CHEMICAL CO., LTD

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

IDENTIDAD DE LA MOLÉCULA:

Nombre común

Acephate

Nombre químico (IUPAC):

O,S-dimethyl acetylphosphoraminothioate

Formula empírica: C₄H₁₀NO₂PS


Peso molecular: 183.2 g/mol

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO:

Apariencia: Polvo Color: Blanco Olor: Característico a mercaptan

pH: 3 - 6 Densidad: 0.5 g/ml a 20 °C

Formula estructural:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- El producto es irritante para los ojos y la piel. Evite el contacto directo.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros), para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Características del equipo y ropa de protección:** Los operarios deberán llevar equipos y ropa protectora en perfectas condiciones.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Organofosforado.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, vértigo, debilidad, constricción de las pupilas, visión borrosa, excesiva salivación, sudoración, calambres abdominales, náusea y vómito.
- En caso de ingestión induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. No dar de beber leche ni productos que contengan aceites.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- En caso de inhalación, mantener al paciente al aire libre, en reposo y abrigado, hasta que llegue el médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: ANTIDOTO: Administrar sulfato de atropina. No administrar 2-PAM (PROTAPAM).

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106, ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Tóxico para el ganado. No permitir a animales en área tratada.
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

APLICACIONES FOLIARES

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil. 200 L		
FRIJOL	"Gusano medidor"	<i>Pseudaletia includens</i>	1 - 1,5	400-500	3	3
TOMATE	"Gusano del fruto"	<i>Spodoptera eridania</i>	1,5	500	4	1
ALFALFA	"Caballada"	<i>Anticarsia gemmatilis</i>	1 - 1,5	400-500	7	10
TABACO	"Gusano comigano"	<i>Manduca sexta</i>	1 - 1,5	400-500	3	1,5

Volumen de agua de aplicación: 400-600 L/ha

TRATAMIENTOS DE SEMILLAS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
ALGODÓN			5 g/kg de semilla	230g /qq de semilla	2
FRIJOL	"Gusano de tierra"	<i>Feltia experta</i>	5 g / kg de semilla	----	0,5
MAÍZ	"Gusano picador"	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	5g / kg de semilla	125g / 25 kg. de semilla	2

P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN:

Una vez terminado el trabajo, los equipos y utensilios de aplicación deben lavarse prolijamente con abundante agua, llenando y vaciando los tanques por tres veces en lugares ya tratados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ACETHION 75PS es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión. En aplicaciones al follaje, controla a diversas plagas que dañan a los cultivos de frijol, tomate, alfalfa, tabaco. También se usa para impregnación de semillas en algodón, frijol y maíz, protegiendo a las plántulas contra gusanos de tierra y gusanos cortadores durante su primera etapa de crecimiento.

APLICACIONES FOLIARES: ACETHION 75 PS se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua. Realizar con cualquier equipo de aspersión terrestre en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS: Impregnación de semillas agregando el producto sobre la semilla húmeda o en una solución del producto con suficiente agua para mojar bien las semillas. El tratamiento de semilla se efectúa un día antes o el mismo día del sembrío.

CEBOS: Para la preparación de cebos usar 50g de **ACETHION 75PS** por 50Kg de "afrecho" y 5 galones de melaza. Distribuir el preparado en el campo al atardecer.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando aparezca la plaga. Repetir si fuera necesario, cuando se observe una re-infestación. En tratamiento de semillas, aplicar antes de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

