

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. No mezclar con productos de reacción alcalina.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurinas y Triazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 / FARMAGRO S.A.: (01) 614-1500 / CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspoemulsión - SE

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin ..... 133 g/L  
Epoxyconazole ..... 50 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° ..... SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)  
Z.I. Huachipa Este, San Antonio - Huarochiri, Lima.  
Central: (01) 614 1500

**FARMAGRO**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante y Formulador:  
**IPROCHEM (TIANMEN) CO., LTD.**  
No.8, Yanhe RD., Yuekou Town, Tianmen City, Hubei, China

LOTE  
CONTENIDO NETO: **5L**  
FECHA DE FORMULACIÓN  
FECHA DE VENCIMIENTO

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN  
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL  
TÓXICO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**PIKO** es un fungicida con doble mecanismo de acción, el Pyraclostrobin (contacto) inhibe la formación de ATP a nivel de las mitocondrias de las células de los hongos y el Epoxyconazole (sistémico) inhibe la biosíntesis de ergosterol a nivel de la membrana celular del hongo y **PIKO** presenta un efecto preventivo ya que inhibe la germinación de las esporas, desarrollo y penetración del tubo germinativo. Asimismo, presenta una acción curativa, antisporulante y erradicante ya que posee un movimiento sistémico ascendente que inhibe el crecimiento del micelio del hongo que ya se encuentra dentro del tejido vegetal.

**PIKO** se aplica en aspersión con equipos convencionales de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación y mover hasta obtener una mezcla homogénea. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. Realizar la aplicación dirigida al follaje de manera uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGA          |                               | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(Días) | LMR<br>(ppm)   |
|-----------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|           | NOMBRE COMÚN   | NOMBRE CIENTÍFICO             |               |                |                |
| Espárrago | Mancha púrpura | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.75*         | 40             | 0.02'<br>0.05" |

1 Pyraclostrobin

2 Epoxyconazole

\*Gasto de Agua: 600 L/Ha

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **PIKO** hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año para espárrago.  
**PIKO** debe aplicarse en forma preventiva o tan pronto se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

**PIKO** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

**PIKO** no es fitotóxico a la dosis recomendada en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3  
MODERADAMENTE PELIGROSO

