

Etiqueta plana para 3.6 L y 4 L

3

0.5 centimeters

17.00 centimeters

0.5 centimeters

0.3centimeters

0.3centimeters

0.5 centimeters

0.2 cm

0.2 cm

Rextigate™

2311

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Florpyrauxifen-benzyl 12 g/L
Cyhalotop-butyl 160 g/L
Aditivo c.s.p. 1

Reg PQUA N° 3194 - SENASA

Titular del Registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre II,
Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

FORMULADO POR:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



CORTEVA
agiscience



Farmex

Corteva Agriscience LLC,
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
EE.UU.

Farmex S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - Perú
Tel: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 4 LITROS.

LOTE NO.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© TM Marcas Registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.
© Corteva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Rextigate™ es un herbicida sistémico post-emergente controla malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas de importancia económica presentes en el cultivo de arroz. Rextigate™ ofrece una adecuada selectividad al cultivo tanto en sistemas de siembra directa con semilla tapada o destapada y de trasplante. Sus ingredientes activos con modo de acción diferente (Florpyrauxifen-benzyl es miembro de la familia química aryloxicarboxilato, dentro del grupo de las auxinas sintéticas y Cyhalotop-butyl pertenece al grupo químico Aniloxifenoxipropionato), amplían el espectro de control y son una herramienta importante para el manejo de resistencia.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		DOSIS L/Ha(*)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ARROZ	Cebadilla	<i>Echinochloa colona</i>	1.8 a 2.0	60	0.02" 0.4"
	Moca de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	Coquito	<i>Cyperus difformis</i>			
	Leonera	<i>Cyperus esculentus</i>			
	Oreja de ratón	<i>Heteranthera reniformis</i>			
	Gramma	<i>Lepidochloa univernia</i>			
	Verdiguá	<i>Panicum oligosperum</i>			
	Pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>			

(*) Gasto de agua 230 L/Ha

1) Florpyrauxifen-benzyl 2) Cyhalotop-butyl

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicación de Rextigate™ de manera post-emergente temprana en malezas con 2 a 4 hojas y 5 a 10 cm de altura; en etapas de macollamiento del cultivo de arroz (formación de nuevos tallos en forma progresiva, durante el estado vegetativo), aproximadamente a los 22 días después del trasplante.

Realizar una aplicación por campaña, una campaña por año.
Realizar calibración de equipos antes de la aplicación.

Manejo de resistencia: Rextigate™ contiene los ingredientes activos Florpyrauxifen-benzyl (GRUPO HRAC 4) y Cyhalotop-butyl (GRUPO HRAC 1). No se recomienda usar únicamente Rextigate™ u otros herbicidas del GRUPO 4, ni del GRUPO 1, para controlar la misma maleza durante toda la temporada. Realice una aplicación por ciclo de cultivo y asegúrese de mantener un intervalo de 7 días con la aplicación de cualquier otro herbicida. Asegúrese que Rextigate™ sea el primer herbicida postemergente que se aplique en el ciclo. Se recomienda rotar las aplicaciones con productos que tengan diferentes modos de acción. En caso de realizar mezclas de tanque, se recomienda hacerlo con productos de diferente modo de acción, teniendo cuidado de no generar incompatibilidades que conlleven a daños potenciales al cultivo o pérdida de eficacia.

No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado. Se alerta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las malezas. Elimine de manera manual o con un herbicida de otro modo de acción cualquier maleza que haya sobrevivido a la aplicación de Rextigate™ y evite que produzca semillas.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar 12 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD

- Rextigate™ es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas y fungicidas de uso común en el cultivo del arroz. Sin embargo, se recomienda hacer una premezcla antes de su utilización.
- No se recomienda la mezcla de tanque con productos que contengan bispyrifos-sodio o propanil ya que se puede presentar antagonismo en el control de algunas malezas.
- Se recomienda el uso de correctores de pH o dureza para el agua de aplicación en caso de ser necesario.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos. Rextigate™ muestra una adecuada selectividad al cultivo de arroz si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Evite aplicaciones sobre arroz de menos de 3 hojas de desarrollo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comunique con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

El producto es de CUIDADO, no ingerir.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Aryloxicarboxilato; Aniloxifenoxipropionato.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, CISPPOQUIM: 080-050-847, Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multécilo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el lavado triple del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

